

धानको गभारो किरा व्यवस्थापन (Rice Stem Borer Management)

सिर्पोफागा इन्सर्टुलास (Walker)

Yellow Borer - *Scirpophaga incertulas* (Walker)

परिचय

गभारो धानको महत्वपूर्ण किरा हो। यो पुतली वर्गको किराको लार्भाले गुवो खाइ नोक्सान पुऱ्याउँछ।



लार्भा: हलुका पहेंलो रंग, २ सेमी लामो।



माउ: पातको टुप्पोमा १००-२०० फूलका थुप्रा, नरम रेशमी भुवाले ढाकिएको (पहेंलो वा सेतो)।



अण्डा (१ हप्ता) → लार्भा डाँठमा प्वाल पारेर भित्र प्रवेश (नरम गुदि खान्छ)।

क्षतिको लक्षण



चित्र नं. १ र २: धानमा लाग्ने गवारो किरा र यसले पुऱ्याएको क्षतिको लक्षण



डाँठमा स्पष्ट प्वाल।



मृत गुवो (Dead Heart): सेतो बाला (Whitehead): गाँज हाल्ने अवस्थामा सुकेको बाला लाग्ने अवस्थामा र तान्दा सजिलै आउने। नोक्सानी। सुकेको वा फुसो

व्यवस्थापन विधि



कृषिजन्य: धान काट्दा जमिनको सतह छुने गरी काट्नुहोस्, वा ठुटा निकाली जलाउनुहोस् / १ हप्ता पानी जम्मा गर्नुहोस्।



नर्सरी: धान रोप्ने बेलामा बेर्नाको पातको टुप्पो (३ देखि ५ सेमी) चुँडेर नष्ट गर्नुहोस्।



भौतिक: धान खेती वरिपरि बत्तीको पासो प्रयोग गर्नुहोस्।



जैविक: सिर्पो ल्यूर (Scirpo Lure) युक्त पासो २ वटा प्रति रोपनी प्रयोग गर्नुहोस्। पासोमा परेका कीरालाई नष्ट गर्नुहोस् र लोभ्याउने पदार्थ ३०/३० दिनमा फेर्नुहोस्।



रासायनिक (Alert): प्रकोप १ रोपनीमा १० भन्दा बढी गाँजमा आक्रमण देखिएमा: फ्लुवेनडाईएमाइड २०% WG (२.५ ग्राम प्रति १० लिटर पानी) वा फिप्रोनिल ५% SC (२ मिली प्रति लिटर पानी) गुभोमा केन्द्रित गरी छर्कनुहोस्। अथवा कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ४% GR (१ किलोग्राम प्रति रोपनी) छिपछिपे पानीमा छर्कनुहोस्। गभारोको प्रकोप हेरी १५/१५ दिनको फरकमा २/३ पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्।



गण्डकी प्रदेश सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पोखरा, नेपाल
फोन नं ०६१-४६७७०८
website: molmac.gandaki.gov.np
Email: molmacprovince4@gmail.com



गण्डकी प्रदेश सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
प्रदेश कृषि प्रयोगशाला
पोखरा, नेपाल
फोन नं ०६१-४६१५४५
Email provinceagrilabpokhara@gmail.com>



थप जानकारीको लागि