



कालाजार रोग



नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र
२०८०/८१

कालाजार रोगको परिचय

कालाजार रोग भुसुना (Sand Fly) को टोकाइका कारण सर्ने किटजन्य सरूवा रोग हो । कालाजार रोग सार्ने भुसुनाहरू तराईको गर्मी ठाउँमा बढी पाइन्छन् तर यी भुसुनाहरू पहाडी तथा हिमाली भेगमा समेत भेटिन थालेका छन् । यो रोग जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ ।




प्रश्न: दिइएको चित्रबाट तपाईंले के बुझ्नुहुन्छ ?

छलफलको विषयहरू:



- ☞ कालाजार रोग लागेको मानिस
- ☞ कालाजार रोग सार्ने भुसुना

कालाजार रोगको परिचय



कालाजार रोग कसरी सध्छ ?

- ☞ संक्रमित भुसुनाले मानिसलाई टोकेमा यो रोग सर्ने गर्दछ ।
- ☞ साँझ वा बिहानीपख घर बाहिर बसेको तथा काम गरिरहेको बेलामा शरीरको खुल्ला भागमा भुसुनाले बढी टोक्ने गर्दछ । राति सुतेको समयमा पनि भुसुनाले टोक्ने गर्दछ ।




प्रश्न: दिइएको चित्रबाट तपाईंले के बुझ्नुहुन्छ ?

छलफलको विषयहरू:


- ☞ कालाजार रोग लगाउने भुसुना
- ☞ कालाजार रोग सर्ने तरिका-मानिस र भुसुना

કાલાજાર રોગ કસરી સધ્ધ ?



कालाजार रोग सार्ने भुसुनाबारे जानकारी

- भुसुना लामखुट्टे भन्दा साना किरा हुन् ।
- भुसुना गोबर र माटो मिलाएर बनाएका फुसको ओसिलो भएका घर, चिरा परेका घरका भित्ताहरू, मुसाले खनेको ओसिलो माटो, मुसाको दुलो, गाई, भैसीको गोठ, दाउरा/गुइँठा राख्ने ठाउँ र फोहरमैला थुप्रिएको स्थानमा बस्छन् ।
- भुसुना साधारणतया भुईँ भन्दा ६ फिट माथिसम्म पाइन्छन् र भुसुना उड्न सक्दैनन्, मात्र उफ्रिन्छन् ।




प्रश्न: दिइएको चित्रबाट तपाईंले के बुझ्नुहुन्छ ?

छलफलको विषय:


☞ भुसुनाको विशेषताहरू

कालाजार रोग सार्ने भुसुनाबारे जानकारी



कालाजारका लक्षण तथा चिन्हहरू

- ज्वरो आउने (२ हप्ता वा सो भन्दा बढी)
- शरीरको तौल घट्ने, दुब्लाउँदै जाने
- फियो (Spleen) तथा कलेजो (Liver) सुनिने (पेट सुन्निएको जस्तो हुने)
- शरीरमा रगतको कमी हुने (रातो रक्त कोष, सेतो रक्त कोष र प्लेटलेट कम हुने)
- यो रोग लागेपछि रोगीको अनुहार, हात खुट्टा तथा शरीरको छाला हल्का कालो हुँदै जाने
- खाना अरुची हुने, आदि ।




प्रश्न: दिइएको चित्रबाट तपाईंले के बुझ्नुहुन्छ ?

छलफलको विषय:


☞ कालाजार रोगको लक्षणहरू के के हुन् ?

कालाजारका लक्षण तथा चिन्हहरू



कालाजारको निदान/पहिचान

- कालाजार रोगको शङ्का लागेमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा गई स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्दछ ।
- कालाजार रोगको जाँच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालहरूमा रगतको परीक्षण पश्चात तुरुन्त पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
- कालाजार रोगको परीक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपलब्ध छ ।





प्रश्न: दिइएको चित्रबाट तपाईंले के बुझ्नुहुन्छ ?

छलफलको विषय:


☞ कालाजार रोगको निदान/पहिचान कहाँ कहाँ हुन्छ ?

कालाजारको निदान/पहिचान



कालाजार रोगको उपचार

- कालाजारको उपचार एकदम प्रभावकारी छ । सामान्यतया एक दिनको उपचारमा नै यो रोगलाई निको पार्न सकिन्छ ।
- कालाजार रोगको निदान (पहिचान) सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म र उपचार सेवा तोकिएका अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपलब्ध छ ।
- कालाजारको प्रत्येक बिरामीले तोकिएका अस्पतालहरूमा गई उपचार गराएमा सरकारले यातायात खर्च बापत रु.२,०००/- रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ ।
- कालाजार उपचार नगरेका बिरामीले अरुलाई पनि यो रोग भुसुना मार्फत सार्न सक्दछन् ।





प्रश्न: दिइएको चित्रबाट तपाईंले के बुझ्नुहुन्छ ?

छलफलको विषयहरू:


- ☞ कालाजार रोगको उपचार कहाँ हुन्छ ?
- ☞ सरकारबाट कालाजारको उपचारका लागि के के सुबिधा उपलब्ध गराईएको छ ?

कालाजार रोगको उपचार



कालाजार रोगको रोकथाम




- घर वरिपरि भुसुनाले फुल पार्न सक्ने ठाउँहरू सफा गर्नुपर्छ ।
- घर-कटेराका चर्केका भित्ताहरू टालिने गरी लिपपोत गर्नुपर्छ ।
- भुसुनाको टोकाइबाट बच्न पूरा शरीर ढाक्ने लुगा लगाउनु पर्छ ।
- भुसुनाको टोकाइबाट बच्न सधैं भुल लगाएर खाटमा सुत्नु पर्छ ।
- भुसुनाको प्रकोप ज्यादै भएमा घर भित्र विषादी छर्किनु पर्छ र विषादीको लागि नजिकको स्वास्थ्य चौकी वा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु पर्छ ।
- कीटनाशक विषादी छर्केको ठाउँमा ३ महिना सम्म लिपपोत गर्नु हुँदैन ।



प्रश्न: दिइएको चित्रबाट तपाईंले के बुझ्नुहुन्छ ?
छलफलको विषयहरू:

- ☞ भुसुनाको बासस्थान
- ☞ भुसुनाको टोकाइबाट बच्ने तरिकाहरू


कालाजार रोगको रोकथाम



छालाको कालाजार (पि.के.डि.एल.) रोगीको पहिचान

➔ कहिलेकाहीँ कालाजार छालामा पनि हुन सक्छ । यदि छालामा नचिलाउने, नदुख्ने स-साना सेतो दाग (दुबी जस्तो), स-साना फोका, पाप्रा वा गिर्खा देखिएमा छालाको कालाजार रोग भएको हुनसक्छ ।

➔ छालाको कालाजार भएको बिरामीले अन्य मानिसहरूलाई धेरै छिटो कालाजार रोग सार्ने भएकाले यसको तुरुन्त उपचार गर्नुपर्छ ।




प्रश्न: दिइएको चित्रबाट तपाईंले के बुझ्नुहुन्छ ?

छलफलको विषय:

☞ पि.के.डि.एल.को लक्षणहरू


धालाको कालाजार (पि.के.डि.एल.) रोगीको पहिचान



कस्ता व्यक्ति बढी जोखिममा हुन्छन् ?

कालाजार रोग जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ तर तलका समूहलाई यो रोग बढी देखिने गरेको छः

- ➔ बालबालिका (पाँच वर्ष भन्दा मुनि)
- ➔ कुपोषित व्यक्तिहरू
- ➔ माटोको घर/कच्ची घरमा बस्ने व्यक्तिहरू
- ➔ घरको नजिक गोठ/खोर भएका परिवार
- ➔ अन्य शरीर कमजोर बनाउने रोग जस्तै क्षयरोग, एच.आइ.भी. संक्रमित व्यक्तिहरू
- ➔ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिहरू ।




प्रश्न: दिइएको चित्रबाट तपाईंले के बुझ्नुहुन्छ ?


छलफलको विषय:

➔ बढी जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू

कस्ता व्यक्ति बढी जोखिममा हुन्छन् ?



कालाजारको बारेमा सबैले जान्ने पर्ने कुराहरू



कालाजार कडाखालको सरुवा रोग हो ।



कालाजारको उपचार निःशुल्क हुन्छ ।

कालाजारको उपचार समयमा नगरे ज्यानै जान सक्छ ।



नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र

२०८०/८१