

नेपालमा विकसित बालीका महत्वपूर्ण जातको जातीय विवरण



नेपाल सरकार
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र
हरिहरभवन, ललितपुर

नेपालमा विकसित बालीका महत्वपूर्ण जातको जातीय विवरण

प्रकाशक : बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र
हरिहरभवन, ललितपुर
फोन नं. : ५५३४२९८/५५२९३५९
ईमेल : info@sqcc.gov.np
वेबसाइट : www.sqcc.gov.np

सम्पादन मण्डल

बेनु प्रसाद प्रसाई

(प्रमुख, रा.प.प्रथम. प्रा.)

डा. प्रकाश आचार्य

(वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत)

शालिकराम गौतम

(वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत)

उत्सव भण्डारी

(बाली विकास अधिकृत)

सर्वाधिकार : बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर

प्रकाशन मिति : २०८३ असार

प्रकाशन प्रति : ३५० प्रति

मुद्रण : आउटलाईन प्रिन्टिङ एण्ड ट्रेड प्रा.लि., नयाँबानेश्वर (०१-५२४४९८४)

दुई शब्द

बीउ बिजन ऐन, २०४५ को दफा ११ख. मा नेपालमा सूचित वा पञ्जीकृत जातका बीउ बिजन मात्र कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ऐनको दफा ११ मा बीउ बिजनका किसिम वा जात सूचित वा पञ्जीकृत गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाका आधारमा बीउ बिजन नियमावली, २०८१ को नियम ९ मा बीउ बिजनको अनुमोदन, उन्मोचन तथा दर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी, नियम १० मा नियम ९ बमोजिम उन्मोचन तथा दर्ता भएका बीउ बिजनका किसिम वा जात सूचित वा पञ्जीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ। उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाका आधारमा हालसम्म बीउ बिजन ऐन, २०४५ को दफा ३ बमोजिम गठित राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिबाट उन्मोचन वा दर्ता गरिएका १९३ बालीका १,६५८ वटा बीउ बिजनका किसिम वा जात सूचित तथा पञ्जीकृत भएका छन्। तीमध्ये ३२२ जात उन्मोचन विधिबाट र १,३३६ जात दर्ता विधिबाट सूचित वा पञ्जीकृत भएका छन्।

बीउ बिजन नियमावली, २०८१ को नियम ९ को उपनियम (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोजिम उन्मोचन तथा दर्ता भएका बीउ बिजनका किसिम वा जातको नेपालमा बीउ प्रणाली रहेको छ। यस्ता जातका चारित्रिक गुणहरू जात पहिचान तथा बीउ प्रमाणीकरणका लागि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेका छन्। यसै सन्दर्भमा, यस पुस्तिकामा नियम ९ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम उन्मोचन भई नियम १० को खण्ड (क) बमोजिम सूचित भएका नेपालमा विकास गरिएका बीउ बिजनका किसिम वा जात तथा नियम ९ को उपनियम (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम दर्ता भई नियम १० को खण्ड (ख) बमोजिम पञ्जीकृत भएका स्थानीय बीउ बिजनका किसिम वा जातका जातीय तथा चारित्रिक गुणहरू समावेश गरी प्रकाशन गरिएको छ।

यो पुस्तिका जात विकासमा संलग्न निकाय, बाली प्रजनक, बीउ उत्पादन तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी निकाय र तिनमा कार्यरत बीउ बिजन निरीक्षक तथा प्राविधिक, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कृषि प्राविधिक एवं अन्य सरोकारवाला निकायका लागि उपयोगी हुने विश्वास लिएको छु। यसले विभिन्न जातका विशेषतासम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्नुका साथै जात पहिचान तथा बीउ प्रमाणीकरणसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिमा समेत योगदान पुऱ्याउने अपेक्षा गरेको छु।

यस पुस्तिका तयारीका क्रममा आवश्यक सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराई सहयोग पुऱ्याउनु हुने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, परिषद् अन्तर्गतका राष्ट्रिय बाली अनुसन्धान कार्यक्रम तथा केन्द्रहरू, सम्बन्धित बाली प्रजनक, राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको सचिवालय तथा सम्बद्ध कर्मचारी, कृषि विभाग अन्तर्गतका विभिन्न निकाय तथा फार्म/केन्द्रहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै, विभिन्न स्रोतबाट विवरण संकलन गरी पुस्तिका तयार गर्न विशेष योगदान पुऱ्याउनु हुने बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत श्री शालिकराम गौतम, बाली विकास अधिकृत श्री उत्सव भण्डारी लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू प्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

बेनु प्रसाद प्रसाई

प्रमुख

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर

विषय-सूची

धान बाली	१
गहुँ बाली	१०३
मकै बाली	१६५
आलु बाली	२१९
तरकारी बाली	२५१
मसला बाली	२८१
दलहन र तेलहन बाली	२९१
फलफूल बाली	३३१



धानका जात

- | | | |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| १) बहुगुणी धान—१ | १८) राधा—१४ | ३५) सुख्खा धान—५ |
| २) बहुगुणी धान—२ | १९) सेहराङ्ग सव—१ | ३६) सुख्खा धान—६ |
| ३) चैते—५ | २०) सुगन्धित धान—१ | ३७) स्वर्णा सव—१ |
| ४) हर्दिनाथ हाईब्रिड-१ | २१) लेकाली धान—१ | ३८) सांवा मसुली सव—१ |
| ५) हर्दिनाथ हाईब्रिड-३ | २२) लेकाली धान—३ | ३९) वर्षे-३००४ |
| ६) हर्दिनाथ बोरो धान-१ | २३) खुमल-४ | ४०) तरहरा—१ |
| ७) हर्दिनाथ सवा मंसुली | २४) खुमल-८ | ४१) तरहरा—२ |
| ८) शुद्धोधन कालानमक | २५) खुमल—१० | ४२) लल्का बास्मती |
| ९) हर्दिनाथ-१ | २६) खुमल-१२ | ४३) घैया-१ |
| १०) हर्दिनाथ-२ | २७) खुमल—१३ | ४४) सुनौलो सुगन्धा |
| ११) हर्दिनाथ-४ | २८) खुमल-१४ | ४५) पोखरेली जेठोबुढो |
| १२) हर्दिनाथ-६ | २९) खुमाल बासमती-१६ | ४६) रामधान |
| १३) घैया-३ | ३०) खुमाल-१८ | ४७) मिथिला |
| १४) गंगासागर-१ | ३१) सुख्खा धान—१ | ४८) लोकतन्त्र |
| १५) गंगासागर-२ | ३२) सुख्खा धान—२ | ४९) चन्दननाथ-१ |
| १६) राधा-४ | ३३) सुख्खा धान—३ | ५०) मकवानपुर-१ |
| १७) राधा—१३ | ३४) सुख्खा धान—४ | |

१) बहुगुणी धान-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: स्वर्ण सब १ + drought QTLs
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७४ (२०१७)
३. सिफारिस क्षेत्र: समुन्द्र सतहबाट ७०० मि. उचाइसम्मको तराई, भित्री मधेश नदी किनार, बेसी तथा समतल फाँट

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २५० वटा आउने
२. झण्डे पातको कोण (flag leaf angle): ठाडो
३. बालाको आकार: मध्यम
४. बालाको लम्बाई: २४.५ से.मी.
५. बियाँको रङ: सेतो
६. चामलको चमकपन: मध्यम

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: जेठ महिनाको अन्तिम हप्तादेखि असार महिनाको दोस्रो हप्तासम्म ब्याड राख्न सकिन्छ
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १०० दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १३५—१३८ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १०६.८ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ५.५ मे.टन प्रति हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २२ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: डुवान र खडेरी/सुख्खा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. एमाइलोज प्रतिशत:
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत:
४. चामलको वर्गीकरण: मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. डुवान र खडेरी/सुख्खा सहन सक्ने
२. ब्याक्टेरियल पात डुढुवा, मरुवा रोग र सिथ डुढुवा तथा धानमा लाग्ने अन्य खैरो फङ्के, ढुङ्गे कीराहरू, गबारो कीरा प्रतीरोधि क्षमता भएको
३. यो स्वर्ण सब १ जातको background बाट आएको जात हो र यसमा तीन वटा drought QTLs; qDTY१.१, qDTY२.१, qDTY३.१ समावेश गरिएको छन् जुन अरु जातहरूमा छैन। यसले धेरै पानी पनि सहन सक्छ र पछि बाला पसाउने बेलामा पानी परेन भने पनि qDTY१.१, qDTY२.१, qDTY३.१ ले गर्दा बाला पसाउछ र उत्पादनमा धेरै क्षति हुदैन।



जात : बहुगुणी धान-१

२) बहुगुणी धान-२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम:
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७४ (२०१७)
३. सिफारिस क्षेत्र: समुन्द्र सतहबाट ७०० मि. उचाइसम्मको तराई, भित्रि मधेश नदी किनार, बेसी तथा समतल फाँट

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २५० वटा आउने
२. झण्डे पातको कोण (flag leaf angle): ठाडो
३. बालाको आकार: मध्यम
४. बालाको लम्बाई: २५ से.मी.
५. बियाँको रङ: सेतो
६. चामलको चमकपन: मध्यम

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: जेठ महिनाको अन्तिम हप्तादेखि असार महिनाको दोस्रो हप्तासम्म ब्याड राख्न सकिन्छ
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १०८ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४२ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १०३ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ५.८ मे.टन प्रति हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २३.५ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: डुवान र खडेरी/सुख्खा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. एमाइलोज प्रतिशत:
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत:
४. चामलको वर्गीकरण: मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. डुवान र खडेरी/सुख्खा सहन सक्ने
२. ब्यक्टेरियल पात डुडुवा, मरुवा रोग र सिथ डुडुवा तथा धान मा लाग्ने अन्य खैरो फङ्के, दुङ्गे कीरा, गबारो कीरा प्रतीरोधि क्षमता भएको



जात: बहुगुणी धान-२

३) चैते-५

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम:
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७४ (२०१७)
३. सिफारिस क्षेत्र: समुन्द्र सतहबाट ७०० मि. उचाइसम्मको तराई, भित्रि मधेश नदी किनार, बेसी तथा समतल फाँट

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २२० वटा आउने
२. झण्डे पातको कोण (flag leaf angle): मध्यम
३. बालाको आकार: मध्यम
४. बालाको लम्बाई: २३ से.मी.
५. बियाँको रङ: सेतो
६. चामलको चमकपन: मध्यम

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: चैते धानको लागि फागुन दोस्रो हप्तादेखि चैतको दोस्रो हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ९०—९५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२५—१२८ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १२२ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ४.६ मे.टन प्रति हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: १८.६ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: ब्याक्टेरियल पात डुढुवा, मरुवा रोग सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ‘
२. एमाइलोज प्रतिशत: ‘
३. धान कुट्दा निस्कने चामल प्रतिशत: ‘
४. चामलको वर्गीकरण: मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. दुई बाली धान खेतको लागि उपयुक्त
२. ब्याक्टेरियल पात डुढुवा, मरुवा रोग सहन सक्ने
३. अरु चैते जातहरूको (चैते—२, चैते—४, चैते—६ र हर्दिनाथ—१) तुलनामा यो जातको दाना मसिनो, नरम र स्वादिलो हुन्छ।
४. बाला खदिलो हुन्छ र दाना बढि लाग्दछ।



जात: चैते-५

४) हर्दिनाथ हाईब्रिड-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७७ (२०२०)
२. सिफारिस क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश, बेशी र समुद्र सतहभन्दा १००० मि. सम्म

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको औसत उचाइ: ११९ से.मी.

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: असारको दोस्रो हप्तादेखि श्रावणको पहिलो हप्तासम्म; चैते धानको रूपमा पनि लगाउन सकिने; छरुवा विधिबाट पनि खेती गर्न सकिने
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ९४ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२०-१२५ दिन
४. औसत उत्पादन: ६.००-६.५ मे.टन/हे.
५. हजार दानाको तौल: २२.५० ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बखै र चैते धानको रूपमा लगाउन सकिने, बास्नादार
२. नेपालको पहिलो हाईब्रिड



जात: हर्दिनाथ हाइब्रिड-१

५) हर्दिनाथ हाईब्रिड-३

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७७ (२०२०)
२. सिफारिस क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश, बेशी र समुद्री सतहभन्दा १००० मि. सम्म

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको औसत उचाइ: १०७ से.मी.

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: असारको दोस्रो हप्तादेखि श्रावणको पहिलो हप्तासम्म; चैते धानको रूपमा पनि लगाउन सकिने; छरुवा विधिबाट पनि खेती गर्न सकिने
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ८७ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: ११३-११७ दिन
४. औसत उत्पादन: ६.००-६.५ मे.टन/हे.
५. हजार दानाको तौल: २१.५ ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. चामलको वर्गीकरण: मसिनो र लामो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बखैँ र चैते धानको रूपमा लगाउन सकिने, बास्नादार
२. नेपालको दोस्रो हाईब्रिड



जात: हर्दिनाथ हाइब्रिड-३

६) हर्दिनाथ बोरो धान-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७७ (२०२०)
२. सिफारिस क्षेत्र: पूर्वी तराईका क्षेत्रहरू (समुद्र सतहभन्दा ५०० मि. सम्म)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको औसत उचाइ: ११८ से.मी.

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: हिउँद
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १३५ दिन (हिउँदमा), १०५ दिन (वर्षामा)
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १६५ दिन (हिउँदमा), १३५ दिन (वर्षामा)
४. औसत उत्पादन: ६.००-६.५ मे.टन/हे.
५. हजार दानाको तौल: २४.०० ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. चामलको वर्गीकरण: मोटो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बर्खे र हिउदे धानको रूपमा लगाउन सकिने
२. यदि बर्खे लगाएमा १३५ दिनमा पाक्ने र मकवानपूर-१ को विकल्प सम्पूर्ण तराईका लागि



जात: हर्दिनाथ बोरो धान-१

७) हर्दिनाथ सावाँ मंसुली

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७७ (२०२०)
२. सिफारिस क्षेत्र: तराई तथा भित्री मधेश (समुद्री सतह बाट ५०० मि. सम्म)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको औसत उचाइ: १३५ से.मी.

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)


१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: असारको दोस्रो हप्तादेखि श्रावणको दोस्रो हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ११२ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४२-१४५ दिन
४. औसत उत्पादन: ४.५-५.०० मे.टन/हे.
५. हजार दानाको तौल: १७.५ ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. चामलको वर्गीकरण: मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बर्खे र हिउदे धानको रूपमा लगाउन सकिने



जात: हर्दिनाथ सावाँ मंसुली

८) शुद्धोधन कालानमक

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७७ (२०२०)
२. सिफारिस क्षेत्र: तराई तथा भित्री मधेश (समुद्री सतह देखि ५०० मि. सम्म)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको औसत उचाइ: १२८-१३० से.मी.

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: श्रावणको दोस्रो हप्ता सम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १२० दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५०-१५५ दिन
४. औसत उत्पादन: ३.०० मे.टन/हे.
५. हजार दानाको तौल: १५.५ ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. चामलको वर्गीकरण: मसिनो तथा बास्नादार

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बासनादार जात



जात: शुद्धोधन कालानमक

१) हर्दिनाथ-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: विजि १४४२
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६० (२००४)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश, ८०० मीटरसम्मको रिभर बेसिन

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा ३३८ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम ठाडो (semi erect)
३. बालाको आकार: मध्यम खँदिलो
४. बियाँको रङ: फिक्का सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको दोस्रो हप्तादेखि श्रावणको पहिलो हप्तासम्म (छरुवा विधिबाट पनि खेती गर्न सकिने)
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ९४ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२० दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ९४ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ४.०३ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २० ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: सुख्खा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ६.९८
२. एमाइलोज प्रतिशत: २६.१७
३. धान कुट्दा निस्कने चामल प्रतिशत: ६५.७८
४. चामलको वर्गीकरण: मसिनो

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. मध्यम खँदिलो बाला
२. झण्डे पातको कोण मध्यम ठाडो हुने



जात: हर्दिनाथ-१

१०) हर्दिनाथ-२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: बि ६१४४ एफ-एमआर-६-०-०
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६६ (२०१०)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई तथा भित्री मधेश

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा १८८ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम ठाडो (semi erect)
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २३-२७ से.मी.
५. बियाँको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको दोस्रो हप्तादेखि श्रावणको पहिलो हप्तासम्म (विरुवा ३ हप्ताभन्दा बुढो हुनु हुँदैन), छरुवा विधिबाट पनि खेती गर्न सकिने
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ९५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२०-१२५ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ११५ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ३.१-४.२ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २५.८ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: सुख्खा ठाउँमा खेती गर्न सकिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ८.१
२. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ६८; सग्लो चामल: ६२
३. चामलको वर्गीकरण: मोटो लाम्चो

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. मूल सिजनको साथै भदैया खेती समेत गर्न सकिने
२. सानो, सेतो र खस्रो दाना, दानाको भित्री र बाहिरी बोक्रा रातो



जात: हर्दिनाथ-२

११) हर्दिनाथ-४

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७८ (२०२२)
२. सिफारिस क्षेत्र: तराई तथा भित्री मधेश (समुद्री सतह भन्दा ७०० मि. सम्म)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको औसत उचाइ: १०३ से.मी.

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: जेष्ठ महिनाको पहिलो हप्तादेखि असार महिनाको दोस्रो हप्तासम्म ब्याड राख्न सकिन्छ
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ९० दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: ११५ दिन
४. औसत उत्पादन: ४.५-५.०० मे.टन/हे.
५. हजार दानाको तौल: २०.०० ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. चामलको वर्गीकरण: मध्यम लामो र मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. ब्लास्ट प्रतिरोधात्मक
२. बढि गाँज हाल्ने र प्रति बाला दाना संख्या उच्च



जात: हर्दिनाथ-४

१२) हर्दिनाथ-६

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७८ (२०२२)
२. सिफारिस क्षेत्र: तराई तथा भित्री मधेश (समुद्री सतह भन्दा ७०० मि. सम्म)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको औसत उचाइ: १०३ से.मी.

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: जेष्ठ महिनाको अन्तिम हप्तादेखि असार महिनाको दोस्रो हप्ता सम्म ब्याड राख्न सकिन्छ
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १००-१०५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १३५ दिन
४. औसत उत्पादन: ५-६.५ मे.टन/हे.
५. हजार दानाको तौल: १८.०० ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. चामलको वर्गीकरण: मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. मसिना दाना भएको
२. चामल धेरै बस्ने
३. गाँज धेरै हुने र साम्बा मन्सुली भन्दा १० दिन अघि पाक्ने



जात: हर्दिनाथ-६

१३) घैया-३

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७८ (२०२२)
२. सिफारिस क्षेत्र: तराई तथा भित्री मधेश (समुद्र सतहभन्दा ७०० मि. सम्म)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको औसत उचाइ: १२४-१३० से.मी.

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: जेष्ठ महिनाको अन्तिम हप्तादेखि असार महिनाको दोस्रो हप्ता सम्म ब्याड राख्न सकिन्छ
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ७०-७५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १०० दिन
४. औसत उत्पादन: ३.५-५.०० मे.टन/हे.
५. हजार दानाको तौल: २२.०० ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. चामलको वर्गीकरण: मध्यम

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. असिंचित तथा पाखो बारीको लागि
२. बढि गाँज हाल्ने र प्रति बाला दाना संख्या उच्च



जात: धैया-३

१४) गंगासागर-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७८ (२०२२)
२. सिफारिस क्षेत्र: तराई तथा भित्री मधेश (समुद्र सतह देखि ७०० मि. सम्म)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको औसत उचाइ: ९६-१०० से.मी.

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: जेष्ठ महिनाको अन्तिम हप्तादेखि असार महिनाको दोस्रो हप्तासम्म ब्याड राख्न सकिन्छ
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ११०-११५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४५ दिन
४. औसत उत्पादन: ३.००-३.५ मे.टन/हे.
५. हजार दानाको तौल: १८.०० ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. चामलको वर्गीकरण: मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. ढुवान सहन सक्ने



जात: गंगासागर-१

१५) गंगासागर-२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७८ (२०२२)
२. सिफारिस क्षेत्र: तराई तथा भित्री मधेश (समुद्र सतह भन्दा ७०० मि. सम्म)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको औसत उचाइ: १०५-१०८ से.मी.

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: जेष्ठ महिनाको अन्तिम हप्तादेखि असार महिनाको दोस्रो हप्ता सम्म ब्याड राख्न सकिन्छ
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १०५-११० दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १३५ दिन
४. औसत उत्पादन: ३.५-४.०० मे.टन/हे.
५. हजार दानाको तौल: २०.०० ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. चामलको वर्गीकरण: मध्यम

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. ढुवान सहन सक्ने



जात: गंगासागर-२

१६) राधा-४

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: -
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०५२ (१९९५)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम तराई (कपिलवस्तु, दाङ, वर्दिया, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २४२ वटा आउने
२. झुण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम ठाडो (semi erect)
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २६ से.मी.
५. चामलको चमकपन: -

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको तेस्रो हप्तादेखि श्रावणको तेस्रो हप्तासम्म, छरुवा विधिबाट पनि खेती गर्न सकिने
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १०१ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२५ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ९५ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ३.२ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २५.२ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: व्याक्टेरियल पात डढुवा र मरुवा रोग अवरोधी, सुख्खा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: -
२. एमाइलोज प्रतिशत: -
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: -
४. चामलको वर्गीकरण: मोटो

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. विपत्रक (Lemma) र अवशल्क (Palea) पराले सेतो रङको हुने
२. खँदिलो बाला र मोटो दाना हुने



जात: राधा-४

१७) राधा-१३

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एनआर ११९०-२४-४-२-२-३
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७४ (२०१७)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई र भित्री मधेशका असिञ्चित क्षेत्र तथा समुन्द्र सतहबाट ७०० मी. उचाइसम्मको नदी किनार, बेसी तथा समतल फाँट र उपत्यकाका सिञ्चित क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २४८ वटा आउने, प्रति बाला २५६ दाना फल्ने
२. झण्डे पातको कोण (flag leaf angle): मध्यम
३. बालाको आकार: मध्यम
४. बालाको लम्बाई: २५.९ से.मी.
५. बियाँको रङ: रातो
६. चामलको चमकपन: मध्यम

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: बैशाख अन्तिम हप्तादेखि श्रावण दोस्रो हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ११२-११५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४२-१४८ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १२५.६ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ३-४.२ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २३.३ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: पानी जम्ने कम मलिलो जग्गामा खेती गर्न सकिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.१५
२. एमाइलोज प्रतिशत: २१.२
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ७२.२; सग्लो चामल: ५२
४. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. कुनै कुनै दानामा टुँडा आउने
२. मसुलीको जस्तो दानाको रङ हुने



जात: राधा-१३

१८) राधा-१४

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आइआर ७७७२१-९३-२-२-१-२
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७३ (२०१६)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई र भित्री मधेशको सिञ्चित क्षेत्र तथा समुन्द्र सतहबाट ७०० मी. उचाइसम्मको नदी किनार तथा उपत्यका

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज २४३ सम्म आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम (intermediate)
३. बालाको आकार: मध्यम
४. बालाको लम्बाई:
५. बियाँको रङ: पराले रङ
६. चामलको चमकपन: मध्यम

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: बैशाख अन्तिम हप्तादेखि श्रावण दोस्रो हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १०३ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १३२ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १०६ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ४.४ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २५ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: सुख्खा अवस्थामा पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिने, मरुवा र पात डढुवा रोग सहने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १०.८
२. एमाइलोज प्रतिशत: २२.२
३. धान कुट्दा निस्कने चामल प्रतिशत: ६८; सग्लो चामल: ५४
४. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मसिनो लामो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. नेपालका हालसम्मको सबै भन्दा लोकप्रिय जात सावित्री degenerate भैसकेको अवस्थामा उस्तै गुण तर सावित्री भन्दा मसिना दाना भएको जात



जात: राधा-१४

१९) सेहराङ्ग सब-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: सेहराङ्ग सब-१
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७४(२०१७)
३. सिफारिश क्षेत्र: समुन्द्र सतहबाट ७०० मी. उचाइसम्मको तराई, भित्री मधेश, नदी किनार, बेसी, तथा समतल फाट र उपत्यकाका सिञ्चित क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २५३ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): ठाडो (erect)
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २४.५ से.मी.
५. बियाँको रङ: पराले सेतो (straw white)
६. चामलको चमकपन: ठिकै (fair)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: बैशाख अन्तिम हप्तादेखि श्रावण दोस्रो हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ९५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२२—१२५ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १०५.२ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ४.४ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २१.७ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पानी जम्ने खालको जग्गामा पनि खेती गर्न उपयुक्त

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १०.०२
२. एमाइलोज प्रतिशत: मध्यम
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ६८; सग्लो चामल: ४८
४. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मसिनो लामो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. हालसम्मका डुवान सहन सक्ने मध्ये सवैभन्दा छिटो पाक्ने मसिनो जात
२. बिरुवाको उचाइ मध्यम खालको
३. मध्यम मसिनो, भात नटाँसिने खालको भएकाले उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने



जात: सेहराङ्ग सब-१

२०) सुगन्धित धान-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: १६७७५
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७३ (२०१६)
३. सिफारिश क्षेत्र: समुन्द्र सतहबाट ७०० मी. उचाइसम्मको तराई, भित्री मधेश, रिभर बेसिन र उपत्यकाको सिञ्चित क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज २४० सम्म आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम (intermediate)
३. बालाको आकार: मध्यम
४. बियाँको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको दोस्रो हप्तादेखि श्रावण दोस्रो हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ११२ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४५ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १०२—१०७ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ४.५ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २२ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: मध्यम अवधिमा तयार हुने जात भएकाले सुख्खा ठाउँमा समेत लगाउन सकिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १०.०५
२. एमाइलोज प्रतिशत: २२.४
३. चामलको वर्गीकरण: मसिनो लामो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बिरुवा अवस्थामा बिरुवाको तथा पकाउँदा भातको वास्ना आउने
२. मसिनो चामल र उत्पादन पनि राम्रो



जात: सुगन्धित धान-१

२१) लेकाली धान-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एनआर-१०४७९
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७१ (२०१४)
३. सिफारिश क्षेत्र: १५०० — २६०० मीटर उचाइसम्मको उच्च पहाडी क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २३९ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): तेर्सो (horizontal)
३. बालाको आकार: मध्यम
४. बालाको लम्बाई: २२.५ से.मी.
५. बियाँको रङ: फिक्का खैरो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: उच्च पहाडी क्षेत्रमा बैशाख अन्तिम हप्तासम्म र सोभन्दा तल्लो क्षेत्रतिर जेठ अन्तिम हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १२० दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५८ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ११५ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ४.०७ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २५.७ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पात र घाँटी मरुवा रोग अवरोधी, चिसो सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.२
२. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ७२.६

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बिरुवाको अन्तर गाँठ हरियो र कष्ठ टुसा छोटो हुने
२. झण्डे पात चन्दननाथ—३ भन्दा चौडा र छोटो हुने



जात: लेकाली धान-१

२२) लेकाली धान-३

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एनआर-१०४८२
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७१ (२०१४)
३. सिफारिश क्षेत्र: १५०० — २६०० मीटर उचाइसम्मको उच्च पहाडी क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २६१ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): तेर्सो (horizontal)
३. बालाको आकार: मध्यम
४. बालाको लम्बाई: २४.५ से.मी.
५. बियाँको रङ: खैरो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: उच्च पहाडी क्षेत्रमा बैशाख अन्तिम हप्तासम्म र सोभन्दा तल्लो क्षेत्रतिर जेठ अन्तिम हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ११७ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५२ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ११६ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ३.९ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २६.७ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पात र घाँटी मरुवा रोग अवरोधी, कम तापक्रम सहन सक्ने, बोट नढल्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ८.५
२. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ७४.३

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बिरुवाको अन्तर गाँठ फिक्का सुनौलो रङ र कष्ठ टुसा लेकाली धान-१ भन्दो लामो हुने
२. झण्डे पात चन्दननाथ-३ भन्दा चौडा र छोटो हुने



जात: लेकाली धान-३

२३) खुमल-४

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एनआर-१००७८
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०४४ (१९८७)
३. सिफारिश क्षेत्र: काठमाडौं उपत्यका तथा समान हावापानी भएको ३००० फीटदेखि ४५०० फीट उचाइसम्मको मध्य पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज ३०० वटा आउने
२. झुण्डे पात कोण (flag leaf angle): -
३. बालाको आकार: -
४. बालाको लम्बाई: २५ से.मी.
५. बियाँको रङ: फिक्का खैरो
६. चामलको चमकपन: -

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)


१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको पहिलोदेखि अन्तिम हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १०५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४४ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १०३ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ६.३ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: १८.४ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: मरुवा रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ८
२. एमाइलोज प्रतिशत: १७.८८
३. धान कुट्दा निस्कने चामल प्रतिशत: ६६.६; सग्लो चामल: ५६.९
४. चामलको वर्गीकरण: लामो मसिनो

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बोटको उचाइ मध्यम र लामो मसिनो दाना
२. बाला र बियाँको रङ फिक्का खैरो



जात: खुमल-४

२४) खुमल-८

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एनआर १०३५३
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६३ (२००७)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य पहाड र तल्लो पहाड

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा ३२९ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): ठाडो
३. बालाको आकार: मध्यम, खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २५ से.मी.
५. बियाँको रङ: सेतो
६. चामलको चमकपन: हुँदैन

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको पहिलो हप्तादेखि श्रावणको पहिलो हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ११७ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५८ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १०५.८ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ७.७ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २३.४ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: सुख्खा ठाउँमा खेती गर्न सकिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ७.४
२. एमाइलोज प्रतिशत: २१.२८
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ७१.१; सग्लो चामल: ६४.३५
४. चामलको वर्गीकरण: मसिनो (पोखरेली मसिनो जस्तै)

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बोट होचो, गाँज ठाडो र धेरै आउने
२. बाली पाक्ने समयमा बाला ठाडो र झण्डे पातमा लुकेको हुने
३. लामो, साँघुरो र सिधा पात



जात: खुमल-८

२५) खुमल-१०

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एनआर १०४९२
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६८ (२०११)
३. सिफारिश क्षेत्र: काठमाण्डौ उपत्यका र सो सरहको हावापानी भएका पहाडी क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २३५ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम
३. बालाको आकार: मध्यम
४. बालाको लम्बाई: २६.२ से.मी.
५. बियाँको रङ: फिक्का खैरो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: मध्य पहाडी क्षेत्रमा आषाढको पहिलो हप्तासम्म र सो भन्दा तल्लो क्षेत्र टार बेशितिर आषाढ अन्तिमसम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ७१ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १३६ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १०५.८ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ४.७८ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २२.७ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: ६० दिनसम्मको वेर्ना रोप्दा प्रचलित जात खुमल-४ भन्दा राम्रो उत्पादन दिएकोले वदलिंदो मौसमी प्रतिकुलतामा असिद्धित क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने र छरुवा धानको रूपमा पनि खेती गर्न सकिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ७.७१
२. एमाइलोज प्रतिशत: १९.५४
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ७०.१; सग्लो चामल: ६०
४. चामलको वर्गीकरण: मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. पाखरेली मसिनो जस्तो देखिने तर चाँडो पाक्ने, नढल्ने र बढि गाँज हाल्ने
२. लामो र चौडा झण्डे पात तथा लामो दाना



जात: खुमल-१०

२६) खुमल-१२

क. जातीय जानकारी:

१. जातीय संकेत (Designation): NR १-१-२-३-८९-१०४९०
२. पैतृक पहिचान (Parentage): खुमल-४/पालुङ-२
३. उत्पत्ति (Origin): नेपाल
४. उन्मोचन वर्ष (Release year): २०२२
५. सिफारिस क्षेत्र (Recommended for): मध्य पहाड
६. स्रोत केन्द्र (Source Centre): NPBGRC खुमलटार

ख. बिरुवाको बनावटसँग र बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agro-morphological characteristics):

१. फूल लाग्न लाग्ने दिन (Days to flowering): १०१
२. पाक्न लाग्ने दिन (Days to maturity): १४६
३. बोटको उचाइ (Plant height, से.मी.): १५०
४. बालाको लम्बाइ (Panicle length, से.मी.): २७
५. प्रति गोलो कल्ला संख्या (Tillers/hill): ८
६. प्रति बाला उर्वर दाना (Fertile grain/panicle): १३१
७. प्रति बाला बाँझो दाना (Sterile grain/panicle): २७
८. उत्पादन (Grain yield, के.जी./हेक्टर): ४७००
९. पराल तौल (Straw weight, के.जी./हेक्टर): ८९००
१०. १००० दानाको तौल (१००० kernel weight, ग्राम): १९.७
११. रोग (Diseases): लर्को (ब्लास्ट) रोग प्रतिरोधी
१२. बालाको रंग (Panicle colour): हल्का खैरो
१३. दानाको रंग (Grain colour): हल्का खैरो
१४. कुटेको चामलको रंग (Milled grain colour): सेतो
१५. दानाको प्रकार (Grain type): पातलो (सिना) दाना
१६. दानाको लम्बाइ (Grain Length, मि.मि.): ६.९
१७. दानाको चौडाइ (Grain Breadth, मि.मि.): २
१८. दाना लम्बाइ: चौडाइ अनुपात (Grain L:B ratio): ३.४५
१९. चामलको दानाको लम्बाइ (Kernel Length, मि.मि.): ९.१
२०. चामलको दानाको चौडाइ (Kernel Breadth, मि.मि.): २.४
२१. चामलको दाना लम्बाइ: चौडाइ अनुपात (Kernel L:B ratio): ३.७९



खुमल-१२

२७) खुमल-१३

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एनआर १०५१५
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६८ (२०११)
३. सिफारिश क्षेत्र: काठमाण्डौ उपत्यका र सो सरहको हावापानी भएका पहाडी क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २९७ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २१.५ से.मी.
५. बियाँको रङ: खैरो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: मध्य पहाडी क्षेत्रमा आषाढको पहिलो हप्तासम्म र सो भन्दा तल्लो क्षेत्र टार बेशितिर आषाढ अन्तिमसम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ७१ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४४ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १०४.८ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ४.१७ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २७.९ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: ६० दिनसम्मको वेर्ना रोप्दा प्रचलित जात खुमल-११ भन्दा राम्रो उत्पादन दिएकोले बदलिंदो मौसमी प्रतिकुलतामा असिञ्चित क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ६.७७
२. एमाइलोज प्रतिशत: १८.५
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ७५.४५; सग्लो चामल: ७२.२८
४. चामलको वर्गीकरण: मध्यम लामो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. कुनै कुनै धानमा छोटो र गुलाबी टुँडा देखिने
२. चौडा झण्डेपात र पाक्ने बेलामा बाला झण्डे पात भन्दा पनि अग्लो हुने



जात: खुमल-१३

२८) खुमल-१४

क. जातीय जानकारी:

१. जातीय संकेत (Designation): NR १०६७६-B-१-३-३-३
२. पैतृक पहिचान (Parentage): खुमल-८/खुमल-६
३. उत्पत्ति (Origin): नेपाल
४. उन्मोचन वर्ष (Release year): २०२२
५. सिफारिस क्षेत्र (Recommended for): मध्य पहाड
६. स्रोत केन्द्र (Source Centre): NPBGRG खुमलटार

ख. बिरुवाको बनावटसँग र बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agro-morphological characteristics):

१. फूल लाग्न लाग्ने दिन (Days to flowering): १०२
२. पाक्न लाग्ने दिन (Days to maturity): १४१
३. बोटको उचाइ (Plant height, से.मी.): १६१
४. बालाको लम्बाइ (Panicle length, से.मी.): २५.८
५. प्रति गोलो कल्ला संख्या (Tillers/hill): ७
६. प्रति बाला उर्वर दाना (Fertile grain/panicle): १२१
७. प्रति बाला बाँझो दाना (Sterile grain/panicle): ३४
८. उत्पादन (Grain yield, के.जी./हेक्टर): ४८११
९. पराल तौल (Straw weight, के.जी./हेक्टर): ६५००
१०. १००० दानाको तौल (१००० kernel weight, ग्राम): २०
११. रोग (Diseases): लर्को (ब्लास्ट) रोग प्रतिरोधी
१२. बालाको रंग (Panicle colour): हल्का खैरो
१३. दानाको रंग (Grain colour): हल्का खैरो
१४. कुटेको चामलको रंग (Milled grain colour): सेतो
१५. दानाको प्रकार (Grain type): पातलो (सिना) दाना
१६. दानाको लम्बाइ (Grain Length, मि.मि.): ६.२
१७. दानाको चौडाइ (Grain Breadth, मि.मि.): २
१८. दाना लम्बाइ:चौडाइ अनुपात (Grain L:B ratio): ३.१
१९. चामलको दानाको लम्बाइ (Kernel Length, मि.मि.): ८.३
२०. चामलको दानाको चौडाइ (Kernel Breadth, मि.मि.): २.३
२१. चामलको दाना लम्बाइ:चौडाइ अनुपात (Kernel L:B ratio): ३.६



खुमल-१२

२९) खुमाल बासमती-१६

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी


१. उत्पत्ति स्थान: आइआरआरआई (IRRI)
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७९ (२०२२)
३. सिफारिश क्षेत्र: निम्न तथा मध्य पहाड (७००-१५०० मि.ओ.स.)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agro-morphological characters)

१. फूल फुल्न लाग्ने समय: ९८ दिन
२. बाली पाक्न लाग्ने समय: १३६ दिन
३. बोटको उचाइ: १०० से.मी.
४. बालाको लम्बाई: २५ से.मी.
५. प्रति बोट गाँजहरूको संख्या: १०
६. प्रति बाला भरिएका दाना संख्या: १८३
७. प्रति बाला नभरिएका दाना संख्या: ३८

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

८. दाना उत्पादन (के.जी./हे.): ४२०० के.जी./हे.
९. पराल उत्पादन (के.जी./हे.): ५२०० के.जी./हे.
१०. हजार दानाको तौल: ३०.२ ग्राम
११. रोग प्रतिरोधक क्षमता: ब्लास्ट रोगप्रति प्रतिरोधी
१२. बालाको रङ: हल्का खैरो
१३. बियाँको रङ: हल्का खैरो
१४. चामलको रङ: सेतो
१५. दानाको प्रकार: मसिनो दाना, राम्रो सुगन्ध
१६. दानाको लम्बाई (मि.मि.): ७.३
१७. दानाको चौडाइ (मि.मि.): २.०
१८. दाना लम्बाइ/चौडाइ अनुपात: ३.६५
१९. भुस निकाल्नु भन्दा अगाडिको दानाको लम्बाइ (मि.मि.): ९.५
२०. भुस निकाल्नु भन्दा अगाडिको चौडाइ (मि.मि.): २.५
२१. भुस निकालेपछिको चामल लम्बाइ/चौडाइ अनुपात: ३.८०



जात: खुमाल बासमती-१६

३०) खुमाल-१८

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उत्पत्ति स्थान: नेपाल
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०८२ (२०२५)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agro-morphological characters)

१. फूल फुल्न लाग्ने समय: १०५ दिन
२. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४५ दिन
३. बोटको उचाइ: १३२ से.मी.
४. बालाको लम्बाई: २४.५ से.मी.
५. प्रति बोट गाँजहरूको संख्या: ११
६. प्रति बाला भरिएका दाना संख्या: १२०
७. प्रति बाला नभरिएका दाना संख्या: २७

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

८. दाना उत्पादन (के.जी./हे.): ५२०० के.जी./हे.
९. पराल उत्पादन (के.जी./हे.): १०५०० के.जी./हे.
१०. हजार दानाको तौल: २४.६ ग्राम
११. बालाको रङ: हल्का खैरो र बियाँको रङ: हल्का खैरो
१२. चामलको रङ: सेतो
१३. दानाको प्रकार: मसिनो दाना
१४. दानाको लम्बाइ (मि.मि.): ६.५
१५. दानाको चौडाइ (मि.मि.): २.१
१६. दाना लम्बाइ/चौडाइ अनुपात: ३.०९
१७. भुस निकाल्नु भन्दा अगाडिको दानाको लम्बाइ (मि.मि.): ८.८
१८. भुस निकाल्नु भन्दा अगाडिको चौडाइ (मि.मि.): २.५
१९. भुसा निकालेपछिको चामल लम्बाइ/चौडाइ अनुपात: ३.५२

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

२०. फलाम (मि.ग्रा./के.जी.): ५९.३ (खैरो चामल); २४ (सेतो चामल)
२१. जिङ्क (मि.ग्रा./के.जी.): २७.९ (खैरो चामल)

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. रोग प्रतिरोधक क्षमता: ब्लास्ट रोगप्रति प्रतिरोधी



जात: खुमाल-१८

३१) सुख्खा धान-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आइआर ७४३७१-४६-१-१
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६८ (२०११)
३. सिफारिश क्षेत्र: पूर्वी तथा पश्चिमी तराई, भित्री मधेश तथा मध्य पहाडको ५०० मीटर उचाइसम्मको बेसी तथा टार

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा १४३ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २३.६ से.मी.
५. बियाँको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको दोस्रो हप्तादेखि श्रावणको दोस्रो हप्तासम्म उपयुक्त हुने र छरुवा तरिकाबाट पनि खेती गरी सन्तोषजनक उत्पादन लिन सकिने
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ९२-९५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२३-१२५ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ९९.१ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ३.२-४.२ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २२ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: डाँठको गवारो र खैरो फड्के कीरा सहन सक्ने, सुख्खा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.५
२. एमाइलोज प्रतिशत: ३५.७
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ६६.८; सग्लो चामल: ४८.३
४. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बोट चाँडै सुक्ने, मध्यम गाँज भएको र छिटो पाक्ने



जात: सुख्खा धान-१

३२) सुख्खा धान-२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आइआर ७४३७१-५४-१-१
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६८ (२०११)
३. सिफारिश क्षेत्र: पूर्वी तथा पश्चिमी तराई, भित्री मधेश तथा मध्य पहाडको ५०० मीटर उचाइसम्मको बेसी तथा टार

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा १८० वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २३.६ से.मी.
५. बियाँको रङ: सेतो
६. चामलको चमकपन:

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको दोस्रो हप्तादेखि श्रावणको दोस्रो हप्तासम्म उपयुक्त हुने र छरुवा तरिकाबाट पनि खेती गरी सन्तोषजनक उत्पादन लिन सकिने
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ९२-९४ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२२-१२४ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ९८.८ से.मी.
५. औषत उत्पादन: २.३-३.५ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २४.४ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: डाँठको गवारो र खैरो फड्के कीरा सहन सक्ने, सुख्खा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.२
२. एमाइलोज प्रतिशत: २२.५
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ६६.८; सग्लो चामल: ४५
४. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मोटो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. मध्यम गाँज भएको, बोट ढिलो सुक्ने, छिटो पाक्ने



जात: सुख्खाधान-२

३३) सुख्खा धान-३

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आइआर ७४३७१-७०-१-१
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६८ (२०११)
३. सिफारिश क्षेत्र: पूर्वी तथा पश्चिमी तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाडको ५०० मीटर उचाइसम्मको बेसी तथा टार

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २१६ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २२.९ से.मी.
५. बियाँको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको दोस्रो हप्तादेखि र श्रावणको दोस्रो हप्तासम्म उपयुक्त हुने र छरुवा तरिकाबाट पनि खेती गरी सन्तोषजनक उत्पादन लिन सकिने
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ९२-९५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२२-१२५ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १०१ से.मी.
५. औषत उत्पादन: २.५-३.६ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २३ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: डाँठको गवारो र खैरो फड्के कीरा सहन सक्ने, सुख्खा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.०५
२. एमाइलोज प्रतिशत: २२.४
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ६६.२; सग्लो चामल: ४८
४. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. मध्यम गाँज भएको, बोट ढिलो सुक्ने, छिटो पाक्ने



जात: सुख्खाधान-३

३४) सुख्खा धान-४

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आइआर ८७७०७—४६६—बि—बि—बि
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७१ (२०१४)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई र भित्री मधेशको असिञ्चित खेत र मध्य पहाडको ५०० मीटर उचाइसम्मको टार बेसी

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २४९ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २३.८ से.मी.
५. बियाँको रङ: सेतो
६. चामलको चमकपन: मध्यम

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको तेस्रो हप्तादेखि श्रावणको दोस्रो हप्तासम्म र छरुवा तरिकाबाट पनि खेती गरी सन्तोषजनक उत्पादन लिन सकिने
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ८०—८५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: ११८—१२५ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ९७—१०२ से.मी.
५. औषत उत्पादन: २.७—४ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: १९.५ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पातको मरुवा र पात डढुवा रोग अवरोधी, डाँठको गवारो र फड्के कीराको क्षति सहन सक्ने, बालीको प्रजनन अवस्थामा सुख्खा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १०.१
२. एमाइलोज प्रतिशत: २२.२
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ७०; सग्लो चामल: ५४
४. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. सुख्खा सहने दुई वटा QTL जीन भएकोले वेर्ना, गाँज, र बाला पसाउने अवस्थामा सुख्खा सहन सक्ने
२. झट्ट हेर्दा आईआर ६४ धान जस्तो देखिने
३. यो जात राधा—४, कान्छी मसुली, घैया—१ र बिन्देश्वरी जातको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ



जात: सुख्खाधान-४

३५) सुख्खा धान-५

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आइआर ८३३८८ बि-बि-१०८-३
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७१ (२०१४)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई र भित्री मधेशको असिञ्चित खेत र मध्य पहाडको ५०० मीटर उचाइसम्मको टार बेसी

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २००-२५९ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): ठाडो
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २२ से.मी.
५. बियाँको रङ: सेतो
६. चामलको चमकपन: मध्यम

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको तेस्रो हप्तादेखि श्रावणको दोस्रो हप्तासम्म र छरुवा तरिकाबाट पनि खेती गरी सन्तोषजनक उत्पादन लिन सकिने
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ९५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२५ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ८९-१२५ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ३.२-४.२ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २०-२१ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पातको मरुवा र पात डडुवा रोग अवरोधी, डाँठको गवारो, फड्के कीराको क्षति सहन सक्ने, बालीको प्रजनन अवस्थामा सुख्खा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.८
२. एमाइलोज प्रतिशत: २२.४
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ७२; सग्लो चामल: ५४
४. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. पात र पातको आवरणको रङ गाढा हरियो
२. बोट हेर्दा स्वर्णा धानको जस्तो, तर दानाको अकार ठूलो र अलि मोटो
३. कान्छी मसुली र सोना मसुलीको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिने



जात: सुख्खाधान-५

३६) सुख्खा धान-६

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आइआर ८३३८३ बि-बि-१२९-४
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७१ (२०१४)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई र भित्री मधेशको असिञ्चित खेत र मध्य पहाडको ५०० मीटर उचाइसम्मको टार बेसी

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २००-२४८ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २५.६ से.मी.
५. बियाँको रङ: सेतो
६. चामलको चमकपन: मध्यम

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको तेस्रो हप्तादेखि श्रावणको दोस्रो हप्तासम्म उपयुक्त हुने र छरुवा तरिकाबाट पनि खेती गरी सन्तोषजनक उत्पादन लिन सकिने
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ८८-९५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२०-१२५ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ९५-१०२ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ३-४ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: १९-२१ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पातको मरुवा र पात डडुवा रोग अवरोधी, डाँठको गवारो, फड्के कीरा सहन सक्ने, बालीको प्रजनन अवस्थामा सुख्खा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.९
२. एमाइलोज प्रतिशत: २२.१
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ६८; सग्लो चामल: ५४
४. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बढि पानी र सुख्खा दुवै सहन सक्ने
२. पात र पातको आवरणको रङ फिक्का हरियो
३. वेर्ना, गाँज, र बाला पसाउने अवस्थामा सुख्खा सहन सक्ने



जात: सुख्खाधान-६

३७) स्वर्णा सव-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आइआर ०५ एफ १०२
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६८ (२०११)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाडको ५०० मीटर उचाइसम्मका सिञ्चित तथा घोल क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २४६ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): ठाडो
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २४ से.मी.
५. बियाँको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको दोस्रो हप्तादेखि श्रावणको दोस्रो हप्तासम्म, छरुवा विधिबाट पनि खेती गर्न सकिने
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १२२—१३० दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५०—१५५ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ७७ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ४—५ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: १९ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पातको मरुवा र डुबुवा रोग सहन सक्ने, डुवान सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ८.८५
२. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ७०; सग्लो चामल: ६२
३. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बाला पाक्ने बेलासम्म बोट हरियो हुने
२. बोटको उचाई र बाला पसाउने समय एकनासको हुने
३. बाला धेरै लाग्ने र गाँज बढी आउने



जात: स्वर्णा सव-१

३८) सांवा मसुली सब-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आइआर ०७ एफ १०१
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६८ (२०११)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई तथा भित्री मधेश र मध्य पहाडको ५०० मीटर उचाइसम्मका सिञ्चित तथा घोल क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २१२ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): ठाडो
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २३ से.मी.
५. बियाँको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको दोस्रो हप्तादेखि श्रावणको दोस्रो हप्तासम्म, छरुवा विधिबाट पनि खेती गर्न सकिने
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १२०—१२८ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४५—१५० दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ८२ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ३.५—४ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: १३.१५ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पातको मरुवा र डुढुवा रोग सहन सक्ने, ढुवान सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १०.३
२. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ७०; सग्लो चामल: ६४
३. चामलको वर्गीकरण: मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. फिक्का हरियो बोट, सेतो र मसिनो दाना
२. बालामा दाना लागेपछि पनि पूरा नझुक्ने



जात: सांवा मसुली सब-१

३९) वर्षे-३००४

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एलडी (एलआइआरआइ-एम-११)
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६३ (२००६)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई र भित्री मधेश

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २६४ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): ठाडो
३. बालाको आकार: मध्यम
४. बालाको लम्बाई: २७ से.मी.
५. बियाँको रङ: खैरो
६. चामलको चमकपन: घीउ जस्तो सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको अन्तिम हप्तादेखि श्रावणको तेस्रो हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ११५-१२७ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५७ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ९७ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ३.८ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २३.५ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: मरुवा रोग अवरोधी, सुख्खा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १०.९
२. एमाइलोज प्रतिशत:
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत:
४. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मसिनो

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बाला पाक्ने बेलासम्म पनि पात हरियो हुने
२. बोट नढल्ने, धेरैजसो दानामा भुस हुँदैन तर बालाको टुप्पाको दानामा मसिनो भुस हुन्छ



जात: वर्षे-३००४

४०) तरहरा-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आइआर ८०४११-बि-४९-१
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६६ (२०१०)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य तथा पूर्वी तराई

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २३७ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम (intermediate)
३. बालाको आकार: मध्यम खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २४ से.मी.
५. बियाँको रङ: सेतो
६. चामलको चमकपन: ३-५ % (मध्यम)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. वेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको दोस्रोदेखि साउनको पहिलो हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ९४-९७ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: ११३-१२५ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १००-११३ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ४.२ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २७.९ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: सुख्खा ठाउँमा खेती गर्न सकिने, भदैया खेतीको रूपमा पनि लगाउन सकिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ८.२
२. एमाइलोज प्रतिशत: २८.२
३. धान कुट्दा निस्कने चामल प्रतिशत: ७२; सग्लो चामल: ६५
४. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. दानाको बाहिरी बोक्रा सेतो रङको
२. चुच्चो परेको (acute) कण्ठ टुसा (ligule)



जात: तरहरा-१

४१) तरहरा-२

क. उन्मोचन तथा परिचय सम्बन्धी जानकारी

१. मातापिता (Parentage): NR ११९० / स्वर्ण सब १ (Swarna Sub १)
२. जेनोटाइप (Genotype): Tarahara cross १०२
३. उत्पत्तिको देश (Country of Origin): नेपाल
४. सिफारिस क्षेत्र: कोशी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरू तथा मधेश प्रदेशका सप्तरी र सिरहा जिल्ला

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. डाँठको झुकाव (Culm attitude): अधिक ठाडो (Semi erect)
२. झण्डे पातको कोण (Flag leaf angle): ठाडो (Erect)
३. प्रति बोट बालाको सङ्ख्या: १४ वटा (मध्यम)
४. बालाको लम्बाई: २३—२४.५ से.मी.
५. दानाको (कुटेको) रङ: हल्का खैरो (Light brown)
६. दानाको प्रकार: पातलो/सुर्केदार (Slender)
७. चामलको लम्बाई-चौडाई (LB) अनुपात: ३.७४

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. फूल फुल्न लाग्ने समय: १००—१०५ दिन
२. बाली पाक्न लाग्ने समय: १३५—१४० दिन
३. बोटको औषत उचाइ: १००—१०५ से.मी.
४. औषत उत्पादन: ५.२३१ मे.टन प्रति हेक्टर
५. हजार दानाको तौल: १६.५ ग्राम
६. पाक्ने बेला ढल्ने (Lodging) अवस्था: ० (ढल्दैन)
७. प्रतिकुलता सहने गुण: ब्लास्ट (Blast) र ब्याक्टेरियल पात डडुवा (BLB) रोगप्रति मध्यम सहनशील (MR)

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ७.१६%
२. एमाइलोज प्रतिशत: २०.९३%
३. धान कुट्दा निस्कने चामल प्रतिशत (Milling recovery): ६५.५३%
४. खुदो चामल प्रतिशत (Head rice %): ८७.२५%
५. ब्राउन राइस प्रतिशत (Brown rice %): ७९.०५%
६. चामलको वर्गीकरण: मसिनो (Fine)
७. खरानी प्रतिशत (Crude Ash %): ०.५७%
८. फाइबर प्रतिशत (Crude fiber %): २.३७%
९. कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत: ७५.३९%
१०. फलाम (Iron): १०.६४ मि.ग्रा./१०० ग्राम
११. फस्फोरस (Phosphorus): ५६ मि.ग्रा./१०० ग्राम

१२. जेलेटिनाइजेशन तापक्रम: ७५—७९ (मध्यम)

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. यो जात NR ११९० र स्वर्ण सब १ (Swarna Sub 1) बीचको क्रस (Tarahara cross १०२) बाट विकसित गरिएको हो।
२. ब्याक्टेरियल पात डढुवा (BLB) रोगप्रति मध्यम प्रतिरोधात्मक/सहनशील क्षमता भएको।
३. दानाको आकार मसिनो र खाने गुणस्तर राम्रो भएकोले रन्जित, सोना मसुली जस्ता पुराना जातहरूको उपयुक्त विकल्पको रूपमा किसानहरूबीच छिटो फैलिएको तथा अपनाइएको।
४. कोशी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरू तथा मधेश प्रदेशका सप्तरी र सिरहा जिल्लाका लागि विशेष रूपमा सिफारिस गरिएको।
५. उत्पत्तिको देश नेपाल भएको इनब्रेड (Inbred) जात हो र सिंचित (Irrigated) पर्यावरण प्रणालीका लागि उपयुक्त छ।

४२) लल्का बास्मती

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: लल्का बास्मती
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६६ (२०१०)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य तथा पूर्वी तराई

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा ३०४ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम ठाडो (semi erect)
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २६ से.मी.
५. बियाँको रङ: रातो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको तेस्रो हप्ता
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १२९ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५० दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १४० से.मी.
५. औषत उत्पादन: २.५-३.५ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: १८.३३ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: व्याक्टेरियल पात डुढुवा र मरुवा रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ८
२. एमाइलोज प्रतिशत: २३.४
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ७१.५; सग्लो चामल: ६६
४. चामलको वर्गीकरण: मसिनो

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. दाना र पातबाट बास्ना आउने
२. बियाँको रङ रातो र बाला केही लामो हुने



जात: लल्का बास्मती

४३) घैया-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: राधा-३२ (आइआर-४४५९५-७०)
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६६ (२०१०)
३. सिफारिश क्षेत्र: असिंचित बारी, तराई, टार र मध्य पहाडका उपत्यका

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २५५ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम ठाडो (semi erect)
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २४.७ से.मी.
५. बियाँको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: जेठको अन्तिम हप्तादेखि आषाढको तेश्रो हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ८५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: ११५ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ९८ से.मी.
५. औषत उत्पादन: २.५-३.५ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २१.७ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: सुख्खा ठाउँमा खेती गर्न सकिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ७.२४
२. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ६८; सग्लो चामल: ६६
३. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मसिनो

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बाली छिटो पाक्ने र मसिनो दाना
२. फिक्का हरियो रङको पात, सेतो रङको बियाँ र लामो बाला



जात: चैया-१

४४) सुनौलो सुगन्धा

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: सुनौलो सुगन्धा
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६४ (२००८)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई र भित्री मधेश

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २७२ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम
३. बालाको आकार: मध्यम
४. बालाको लम्बाई: २८.९७ से.मी.
५. बियाँको रङ: हल्का सुनौलो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको पहिलो हप्तादेखि श्रावणको पहिलो हप्तासम्म
२. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५८ दिन
३. बोटको औषत उचाइ: १०५ से.मी.
४. औषत उत्पादन: ३.८ टन/हेक्टर
५. हजार दानाको तौल: १९ ग्राम
६. प्रतिकूलता सहने गुण: पात मरुवा र घाँटी मरुवा रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.८
२. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मसिनो

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बोट नढल्ने, बाला धेरै लामो र सुनौलो दाना
२. बिरुवा तथा दानाबाट हल्का बास्ना आउने



जात: सुनौलो सुगन्धा

४५) पोखरेली जेठोबुढो

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: जेठोबुढो धान
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६३ (२००६)
३. सिफारिश क्षेत्र: पोखरा उपत्यका र त्यस आसपासका क्षेत्रहरू (६०० देखि ९०० मीटर उचाइसम्म)

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा १३८ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २५ से.मी.
५. बियाँको रङ: हल्का खैरो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: जेठको अन्तिम हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १५५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १८०-१८५ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १६८ से.मी.
५. औषत उत्पादन: २.६ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २३ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: गवारो कम लाग्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ८.३४
२. एमाइलोज प्रतिशत: २३.६
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ७१; सग्लो चामल: ७०.६
४. चामलको वर्गीकरण: दाना छोटो र पातलो (short slender)

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. ढिलो पाक्ने र ढिलो पात सुक्ने
२. बेर्ना, फूल फुल्ने र पकाउने बेलामा बास्ना आउने
३. दाना मध्यम लामो तथा आंशिक टुँडा हुने



जात: पोखरेली जेठोबुढो

४६) रामधान

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: ओआर-३६७-एसपी-११
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६३ (२००६)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश (शिवालिक उपत्यका, मकवानपुर, चितवन र नवलपरासी)

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २६६ वटा आउने
२. बालाको लम्बाई: २७ से.मी.
३. बियाँको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको पहिलो हप्तादेखि श्रावणको पहिलो हप्तासम्म (चैते धानको रूपमा पनि लगाउन सकिने)
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १०७ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १३०-१३७ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १०५ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ४-७.२ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २१ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: व्याक्टेरियल पात डढुवा र मरुवा रोग अवरोधी, सुख्खा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ६.०५
२. एमाइलोज प्रतिशत: २२.०८
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ६८; सग्लो चामल: ५९
४. चामलको वर्गीकरण: मसिनो लामो

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. लामो बाला र चम्किलो सेतो पातलो दाना
२. गाँजको सरा फैलिएको हुने



जात: रामधान

४७) मिथिला

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: विपिआई ३-२
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६३ (२००६)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाडको बेसी

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २६८ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम ठाडो (semi erect)
३. बालाको आकार: मध्यम खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: २२.९८ से.मी.
५. बियाँको रङ: हल्का सुनौलो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको दोश्रो हप्तादेखि श्रावणको दोश्रो हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ११८ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४५-१५० दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ११० से.मी.
५. औषत उत्पादन: ३.५-४.५ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: १८.२ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: खैरो फड्के कीरा र डाँठको गवारो कीरा अवरोधी, व्याक्टेरियल पात डुढुवा र मरुवा रोग अवरोधी, सुख्खा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ७.८९
२. एमाइलोज प्रतिशत: १८.४७
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ७२.२४; सग्लो चामल: ४०.३३
४. चामलको वर्गीकरण: मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. गाँज बढी आउने र छरिने
२. दाना मसिनो



जात: मिथिला

४८) लोकतन्त्र

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एनआर १४८७-२-१-२-२-१-१
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६३ (२००६)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश, तल्लो पहाड र मध्य पहाडका नदी किनारा

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा २२८ वटा आउने
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम ठाडो (semi erect)
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बियाँको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको दोश्रो हप्तादेखि श्रावणको दोश्रो हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: ९८ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२५-१३० दिन
४. बोटको औषत उचाइ: १२३ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ३.६ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २० ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: मरुवा रोग अवरोधी, मध्यम खाले सुख्खा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ६८; सग्लो चामल: ४०.३३
२. चामलको वर्गीकरण: मध्यम मसिनो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. सेतो दाना
२. मध्यम उचाइ, बाला राम्ररी फैलिएको हुने



जात: लोकतन्त्र

४९) चन्दननाथ-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: झिनलिङ-७८-१०२
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०५८ (२००२)
३. सिफारिश क्षेत्र: जुम्ला वा सो सरहका हावापानी भएको क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: प्रति वर्ग मीटर बाला लाग्ने गाँज औषतमा ३०३ वटा आउने
२. बालाको आकार: -
३. बालाको लम्बाई: १९ से.मी.
४. बियाँको रङ: गुलाबी खैरो
५. चामलको चमकपन: हुँदैन (रातो रातो खैरो)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: जेठ पहिलो हप्तादेखि आषाढ पहिलो हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: १४९ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १९१ दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ७७ से.मी.
५. औषत उत्पादन: ५.०५ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २२.१ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: मरुवा रोग अवरोधी, चिसो र असिना सहन सक्ने, बाली नढल्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ७.४
२. एमाइलोज प्रतिशत: २२.२
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: ७१.५; सग्लो चामल: ६१.२
४. चामलको वर्गीकरण: मोटो

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. मोटो र गुलाबी खैरो दाना
२. बोट होचो र नढल्ने



जात: चन्दननाथ-१

५०) मकवानपुर-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम : -
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०४४ (१९८७)
३. सिफारिश क्षेत्र : ढुङ्गे कीराको प्रकोप भएको तराई

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको प्रकृति: -
२. झण्डे पात कोण (flag leaf angle): मध्यम ठाडो (semi erect)
३. बालाको आकार: खँदिलो
४. बालाको लम्बाई: -
५. बियाँको रङ: -
६. चामलको चमकपन: -

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बेर्ना सार्ने उपयुक्त समय: आषाढको तेस्रो हप्तादेखि श्रावणको दोस्रो हप्तासम्म
२. फूल फुल्न लाग्ने समय: -
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५० दिन
४. बोटको औषत उचाइ: ११० से.मी.
५. औषत उत्पादन: ४.३ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २५ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: ढुसी कीरा अवरोधी, केही हदसम्म डुवान सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: -
२. एमाइलोज प्रतिशत: -
३. धान कुट्टा निस्कने चामल प्रतिशत: -
४. चामलको वर्गीकरण: मोटो

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. विपत्रक (Lemma) र अवशल्क (Palea) पराले सेतो रङको हुने
२. बाला खँदिलो हुने र झण्डे पात कोण मध्यम ठाडो हुने



जात: मकवानपुर-१



गहुँका जात

- | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| १) जिक गहुँ-१ | ११) डाँफे | २१) अन्नपूर्ण—४ |
| २) जिक गहुँ-२ | १२) धौलागिरी | २२) भृकुटी |
| ३) वोर्लगा २०२० | १३) गौरा | २३) नेपाल २९७ |
| ४) खजुरा ड्युरम-१ | १४) विजय | २४) मुडुले १ |
| ५) खजुरा ड्युरम-२ | १५) एन एल ९७१ | २५) कौटिला |
| ६) मुनाल | १६) आदित्य | २६) तिला |
| ७) च्याखुरा | १७) डब्लु के १२०४ | २७) सुर्मा |
| ८) बाणगंगा | १८) गौतम | २८) हिमगंगा |
| ९) स्वर्गद्वारी | १९) बि एल १४७३ | २९) भेरीगंगा |
| १०) तिलोत्तमा | २०) पासाङ्लामु | ३०) खुमल शक्ति |

१) जिङ्क गहुँ-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी (Release Information)

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एन.एल १३२७
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७७ (२०२१)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश लगायत समुन्द्री सतहबाट ८०० मि उचाइ सम्म

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बालाको किसिम: हल्का समानान्तर
२. दानाको रङ: सेतो गेरु (amber white)
३. दानाको आकार: हल्का लाम्चो (Semi Elliptical)
४. बोटको उचाई: १०० से.मि.
५. प्रति बर्ग मि. प्रभावकारी बालाको संख्या: २१०-३१२
६. झण्डे पातको बाह्य कर्ण Auricle मा वैजनी रंगको उपस्थिति : हुँदैन

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)


१. गाँज संख्या (प्रति बर्ग मिटर): २१०-३१२
२. बोटको औसत उचाइ: १०० से.मी.
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२१ दिन
४. औसत उत्पादन: ४.७-५.९ टन/हेक्टर
५. प्रति बाला दाना संख्या: ४७-५१
६. १००० दानाको तौल: ४०.९-५५ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: खैरो सिन्दुरे, पहेँलो सिन्दुरे र डडुवा (spot blotch) रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. जिंकको मात्रा: ३४.५-४५.६ पी.पी.एम
२. आर्इरन मात्रा: ३९-४१ पी.पी.एम

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. जिंक र आर्इरनको मात्रा बढी भएको बायोफर्टिफाइड जात
२. तराई र भित्री मधेशमा खेती गर्न उपयुक्त, राम्रो उत्पादन दिने



जात: जिङ्ग गहुँ-१ (एन.एल १३२७)

२) जिक गहुँ-२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी (Release Information)

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एन.एल १३६९
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७७ (२०२१)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश लगायत समुन्द्री सतहबाट ८०० मि उचाइ सम्म

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बालाको किसिम: समानान्तर
२. दानाको रङ: गेरु (amber)
३. दानाको आकार: अण्डाकार
४. बोटको उचाई: ९४ से.मि.
५. प्रति बर्ग मि. प्रभावकारी बालाको संख्या: ३५१-३६४
६. झण्डे पातको बाह्य कर्ण Auricale मा वैजनी रंगको उपस्थिति : हुँदैन

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति बर्ग मिटर): ३५१-३६४
२. बोटको औसत उचाइ: ९४ से.मी.
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: ११७-१२० दिन
४. औसत उत्पादन: ५.०-६.५ टन/हेक्टर
५. १००० दानाको तौल: ३८-४०.४ ग्राम
६. प्रतिकूलता सहने गुण: खैरो सिन्दुरे, पहेँलो सिन्दुरे र डडुवा (spot blotch) रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. जिकको मात्रा: ३९.९ पी.पी.एम
२. आईरन मात्रा: ३९.०५ पी.पी.एम

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. जिक र आईरनको मात्रा बढी भएको बायोफर्टिफाइड जात, जिक गहुँ-१ भन्दा बढी उत्पादन दिने छिटो पाक्ने (११७-१२० दिन) र उच्च उत्पादन क्षमता भएको



जात: जिंक गहुँ-२ (एन.एल १३६९)

३) वोलिंग २०२०

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी (Release Information)

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एन.एल १३०७
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७७ (२०२१)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश लगायत समुन्द्री सतहबाट ८०० मि उचाइ सम्म

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बालाको किसिम: समानान्तर
२. दानाको रङ: गेरु (amber white)
३. दानाको आकार: लाम्चो (Elliptical)
४. बोटको उचाई: ८७ से.मि.
५. प्रति बर्ग मि. प्रभावकारी बालाको संख्या: २२५-३०४
६. Stem, Leaf र Ear glaucosity: strong (सुखा र तातो सहनशक्ति बढाउने)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति बर्ग मिटर): २२५-३०४
२. बोटको औसत उचाइ: ८७ से.मी.
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२० दिन
४. औसत उत्पादन: ४.५-५.५ टन/हेक्टर
५. १००० दानाको तौल: ४१-५३ ग्राम
६. प्रतिकूलता सहने गुण: ब्लाष्ट रोग (wheat blast), खैरो सिन्दुरे, पहेँलो सिन्दुरे र डडुवा (spot blotch) रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. Stem and Leaf and ear glaucosity strong भएकाले सुख्खा र तातो सहनसक्ने क्षमता बढी
२. तराई क्षेत्रको उच्च तापक्रम र सुख्खा अवस्थामा राम्रो उत्पादन

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. Wheat blast रोग अवरोधी भएकाले तराई क्षेत्रमा विशेष उपयुक्त
२. बोटमा strong glaucosity भएकाले सुख्खा र तातो हावापानी सहन सक्ने विशेष क्षमता



जात: वोर्लग २०२० (एन.एल १३०७)

४) खजुरा ड्युरम-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७४ (२०१७)
२. उद्गम देश: मेक्सिको
३. सिफारिस क्षेत्र: लुम्बेनी प्रदेशको दाङ, बाँके, बर्दिया र सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कंचनपुरको लागि

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. दानाको रङ्ग: Yellow-amber color
२. दानाको आकार: ठूलो, लाम्चो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाला निस्कने समय: ८० दिन
२. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२६ दिन
३. बोटको औषत उचाइ: ९८ से.मी.
४. औषत उत्पादन: ४.८२ मे.टन प्रति हेक्टर
५. हजार दानाको तौल: ४६ ग्राम
६. गाजको संख्या (प्रति वर्ग मीटर): ३४८

घ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. यो जात बढी फल्ने, नढल्ने, पहेलो, खैरो र कालो (Ug९९) सिन्दुरे र धुलेढुसी रोग अवरोधि छ ।
२. ड्युरम गहुँबाट (Triticum turgidum subsp. durum) विभिन्न परिकारहरू: सुजी, पास्ता, माकारोनी, कुस्कस, खीर, पिज्जा, चाउचाउ, चाउमिन आदि बनाई खाने गरिन्छ ।
३. यो जातको दानामा Carotenoid (yellow) Pigment Content (YPC) को मात्रा धेरै भएकाले, पिठो पहेलो किसिमको हुन्छ र यस बाट बनेको पास्ता सुनौलो रंगको बन्छ ।
४. नेपालमा ड्युरम गहुँको उत्पादन न्यून भएकाले र माग बढेकोले व्यावसायिक रूपमा खेति गर्दा औद्योगिकीकरणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।



जात: खजुरा ड्युरम-१

५) खजुरा ड्युरम-२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७४ (२०१७)
२. उद्गम देश: मेक्सिको
३. सिफारिस क्षेत्र: लुम्बेनी प्रदेशको दाङ, बाँके, बर्दिया र सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कंचनपुरको लागि

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. दानाको रङ्ग: Yellow-amber color
२. दानाको आकार: ठूलो, लाम्चो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाला निस्कने समय: ८५ दिन
२. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२९ दिन
३. बोटको औषत उचाइ: १०० से.मी.
४. औषत उत्पादन: ५.२३ मे.टन प्रति हेक्टर
५. हजार दानाको तौल: ४५.४ ग्राम
६. गाजको संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २८७

घ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. यो जात बढी फल्ने, नढल्ने, पहेलो, खैरो र कालो (Ug९९) सिन्दुरे र धुलेढुसी रोग अवरोधि छ ।
२. ड्युरम (Triticum turgidum subsp. durum) गहुँबाट विभिन्न परिकारहरू: सुजी, पास्ता, माकारोनी, कुस्कस, खीर, पिज्जा, चाउचाउ, चाउमिन आदि बनाई खाने गरिन्छ ।
३. यो जातको दानामा Carotenoid (yellow) Pigment Content (YPC) को मात्रा धेरै भएकाले, पिठो पहेलो किसिमको हुन्छ र यस बाट बनेको पास्ता सुनौलो रंगको बन्छ ।
४. नेपालमा ड्युरम गहुँको उत्पादन न्यून भएकाले र माग बढेकोले व्यावसायिक रूपमा खेति गर्दा औद्योगिकीकरणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
५. खजुरा ड्युरम-१ जातको तुलनामा ढिलो पाक्ने र बढी उत्पादन दिने ।



जात: खजुरा ड्युरम-२

६) मुनाल

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एन एल १०५५
२. उन्मोचन भएको वर्ष: प्रस्तावित
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य र उच्च पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: हुँदैन; सेतो हुन्छ
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath):
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity):
४. बालाको किसिम: हल्का समानान्तर
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: फिक्का गेरु
७. दानाको आकार: अण्डाकार

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): ३४३
२. बोटको औषत उचाइ: ८५ से.मी.
३. बाला निस्कने समय: १११ दिन (असिञ्चित पहाड)
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५४ दिन (असिञ्चित पहाड)
५. औषत उत्पादन: ३.७ टन/हेक्टर (असिञ्चित पहाड)
६. हजार दानाको तौल: ४८ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: तीनै किसिमका सिन्दुरे (यू जि ९९ समेत) र कर्नाल बन्ट रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १२.१
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत:
३. चोकर (bran) प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. ठूलो तथा सेतो दाना, गाँज बढी आउने
२. टुँडा अलि धेरै हुने



जात: मुनाल

७) च्याखुरा

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एन एल ११६४
२. उन्मोचन भएको वर्ष: प्रस्तावित
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य र उच्च पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: हुँदैन; सेतो हुन्छ
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath):
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity):
४. बालाको किसिम: समानान्तर
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतोमा अलि अलि कालो मिश्रित
६. दानाको रङ: सेतो
७. दानाको आकार: अण्डाकार, अलि लाम्चो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): १७१
२. बोटको औषत उचाइ: ९४ से.मी.
३. बाला निस्कने समय: ११३ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५८ दिन
५. औषत उत्पादन: ३.३ टन/हेक्टर (असिञ्चित पहाड)
६. हजार दानाको तौल: ५२ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: तीनै किसिमका सिन्दुरे (यू जि ९९ समेत) रोग अवरोधी; हावापानीको विविधता सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ११.६
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत:
३. चोकर (bran) प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बालाको डाँठ लामो र सिधा
२. लामो झण्डे पात



जात: च्याखुरा

८) बाणगंगा

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: वि एल ३६२३
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७३ (२०१६)
३. सिफारिश क्षेत्र: समुन्द्र सतहबाट ७०० मीटर उचाइसम्मको तराई, टार, उपत्यकाको सिञ्चित र अर्ध सिञ्चित क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: हुँदैन
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath): गाढा
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity): मध्यम
४. बालाको किसिम: टुप्पातिर साँघुरिँदै गएको (tapering)
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: गेरु (amber)
७. दानाको आकार: अण्डाकार

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज सख्या (प्रति वर्ग मीटर): २१४—२२८
२. बोटको औषत उचाइ: ८७ से.मी.
३. बाला निस्कने समय: ६८ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: ११० दिन
५. औषत उत्पादन: ३.३ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ५१.१ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: गहुँका मुख्य मुख्य रोग अवरोधी, असिञ्चित क्षेत्रमा पनि राम्रो उत्पादन दिने, ढिलो छर्दा पनि उत्पादन धेरै नघट्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.३९
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत: ८.८७
३. चोकर (bran) प्रतिशत: ३७.१

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. गाढा हरियो रङको चौडा र लामो झण्डेपात



जात: बाणगंगा

९) स्वर्गद्वारी

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: वि एल ३६२९
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७३ (२०१६)
३. सिफारिश क्षेत्र: समुन्द्र सतहबाट ७०० देखि १४०० मीटर उचाइसम्मको मध्य तथा उच्च पहाड, सिञ्चित तथा अर्ध सिञ्चित क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: हुँदैन; तर बाह्य कर्ण ठुलो हुन्छ
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath): मध्यम
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity): न्यून
४. बालाको किसिम: समानान्तर
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: गेरु (amber)
७. दानाको आकार: अण्डाकार

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २१६
२. बोटको औषत उचाइ: ८१ से.मी.
३. बाला निस्कने समय: १२० दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १६३ दिन
५. औषत उत्पादन: ४.४ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ४७ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: माटोमा बोरोनको मात्रा कम (५ पिपिएम भन्दा थोरै) भए पनि सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ११.२
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत: ९.२४
३. चोकर (bran) प्रतिशत: ४०.२

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. गाढा हरियो रङको चौडा र लामो झण्डेपात
२. बाली पाक्ने बेलासम्म पनि बोट हरियै रहने



जात: स्वर्गद्वारी

१०) तिलोत्तमा

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एन एल १०७३
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७२ (२०१५)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई र भित्री मधेशको सिञ्चित तथा अर्ध सिञ्चित क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: मध्यम
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath): मध्यम
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity): न्यून
४. बालाको किसिम: टुप्पातिर साँघुरिँदै गएको (tapering)
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: गेरु (amber)
७. दानाको आकार: लाम्चो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २३५
२. बोटको औषत उचाइ: ९६ से.मी.
३. बाला निस्कने समय: ६९-८४ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १०५—१२० दिन
५. औषत उत्पादन: २.५—३.२ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ३८ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: सुख्खा र ढिलो छराइमा अरु जातभन्दा राम्रो उत्पादन दिने, दाना नलाग्ने समस्या देखा नपर्ने, तथा बढी तापक्रम सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.३
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत: १०.६
३. चोकर (bran) प्रतिशत: ३५.९

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. चिल्लो र टुप्पो सुकेको झण्डेपात
२. सुख्खा तथा प्रतिकूल अवस्थामा पात र पातको आवरण चिल्लो (waxy) देखिने



जात: तिलोत्तमा

११) डाँफे

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एन एल १०६४
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७२ (२०१५)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य तथा उच्च पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: हुँदैन, सेतो हुन्छ
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath): मध्यम
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity): न्यून
४. बालाको किसिम: टुप्पातिर साँघुरिँदै गएको (tapering)
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: फिक्का गेरु
७. दानाको आकार: अण्डाकार

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २८६
२. बोटको औषत उचाइ: ९६.८ से.मी.
३. बाला निस्कने समय: १२२ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १६३-१७० दिन
५. औषत उत्पादन: ४.४८ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ४७ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: माटोमा बोरोनको मात्रा कम भए पनि सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १०.४
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत: ९.३
३. चोकर (bran) प्रतिशत: ३७.६

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. पात ठाडो र बढी चिल्लो, बालाको डाँठको टुप्पो थोरै बाझो
२. लामो झण्डेपात (३३.३ से.मी.), भुवादर र घुमेको बाह्य कर्ण



जात: डाँफे

१२) धौलागिरी

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: बि एल ३५०३
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६९ (२०१२)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य तथा उच्च पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: मध्यम
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath): मध्यम
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity): न्यून
४. बालाको किसिम: फेद र टुप्पामा साँघुरो तथा बिचमा फुकेको (fusiform)
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: गेरु (amber)
७. दानाको आकार: अण्डाकार

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २१४
२. बोटको औषत उचाइ: १०६ से.मी.
३. बाला निस्कने समय: ११२ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५६ दिन
५. औषत उत्पादन: ३.६-४.९ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ४५.३ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पहेँलो तथा कालो सिन्दुरे रोग अवरोधी, पात डडुवा कम लाग्ने; दाना नलाग्ने समस्या नआउने, र केही हदसम्म तातो हावा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.९४
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत: १०.४२
३. चोकर (bran) प्रतिशत: २५.८

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बाह्य कर्णमा झुस नभएको
२. डब्लु के १२०४ मा झुस (glume) को रङ सेतो हुने गरेकोमा यो जातमा खैरो हुने



जात: धौलागिरी

१३) गौरा

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: बि एल ३२३५
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६९ (२०१२)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य तथा उच्च पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: हुँदैन
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath): मध्यम
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity): न्यून
४. बालाको किसिम: फेद र टुप्पामा साँघुरो तथा बिचमा फुकेको (fusiform)
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: गेरु (amber)
७. दानाको आकार: लाम्चो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २९८
२. बोटको औसत उचाइ: १०७ से.मी.
३. बाला निस्कने समय: ११६ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १६० दिन
५. औषत उत्पादन: ४.२-५.० टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ४६.५ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पहेंलो तथा कालो सिन्दुरे रोग अवरोधी, पात डढ्वा कम लाग्ने, दाना नलाग्ने समस्या नआउने, र केही हदसम्म तातो हावा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १२.८५
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत: ११.३६
३. चोकर (bran) प्रतिशत: २८.२५

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. प्रोटीन प्रतिशत बढी भएकोले रौटी नरम र खान मीठो हुने
२. बोट डब्लु के १२०४ जस्तै देखिने तर गौराको बाला fusiform भएपनि slightly tapering देखिने



जात: गौरा

१४) विजय

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: बि एल ३०६३
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६७ (२०११)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, टार र समुन्द्र सतहबाट ५०० मी. उचाइसम्मको क्षेत्र

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: हुँदैन, सेतो हुन्छ
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath): न्यून
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity): न्यून
४. बालाको किसिम: फेद र टुप्पामा साँघुरो तथा बिचमा फुकेको (fusiform)
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सुनौलो पराले
६. दानाको रङ: सेतो
७. दानाको आकार: अण्डाकार

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २४३-२७२
२. बोटको औषत उचाइ: ९८ से.मी.
३. बाला निस्कने समय: ६६-७७ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १११-१२३ दिन
५. औषत उत्पादन: ४.४५ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ५०.५ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: माटोमा बोरोनको कमी भए पनि सहन सक्ने, उच्च तापक्रम सहन सक्ने र तीव्र गतिमा दाना भरिने क्षमता भएको, ढिलो गरी छर्दा पनि राम्रो उत्पादन दिने, $\mu\text{g}99$ अवरोधी भनि चिनिएको पहिलो जात

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १२.७
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत:
३. चोकर (bran) प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. यसको बालाको आकार fusiform भएको र lower glume beak length अति छोटो भएको हुनाले अन्य जातबाट छुट्टाउन सजिलो हुने
२. Lower glume shoulder width अन्य जातको तुलनामा चौडा भएको



जात: विजय

१५) एन एल ९७१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एन एल ९७१
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६६ (२०१०)
३. सिफारिश क्षेत्र: समुन्द्र सतहबाट ५०० मी. उचाइसम्मको तराई, टार, र उपत्यका

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: मध्यम
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath): मध्यम
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity): मध्यम
४. बालाको किसिम: फेद र टुप्पामा साँघुरो तथा बिचमा फुकेको (fusiform)
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: गेरु (amber)
७. दानाको आकार: लाम्चो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २५०
२. बोटको औषत उचाइ: ९५ से.मी.
३. बाला निस्कने समय: ८१ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२२ दिन
५. औषत उत्पादन: ४.५३ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ४२ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पाते र पहेँलो सिन्दुरे रोग अवरोधी, उच्च तापक्रम सहन सक्ने र तीव्र गतिमा दाना भरिने क्षमता भएको

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १०.५-१२.६
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत:
३. चोकर (bran) प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बिरुवाको शुरु अवस्थामा प्रशस्त गाँज आउने भएकाले भारपात समेत नियन्त्रण हुने
२. उच्च तापक्रम र तातो हावा चल्दा समेत पात हरियै रहने



जात: एन एल ९७१

१६) आदित्य

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: बि एल ३२६४
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६६ (२०१०)
३. सिफारिश क्षेत्र: समुन्द्र सतहबाट ५०० मी. उचाइसम्मको तराई, टार, र उपत्यका

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: मध्यम
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath): मध्यम
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity): मध्यम
४. बालाको किसिम: समानान्तर
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: गेरु (amber)
७. दानाको आकार: लाम्चो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २५५
२. बोटको औषत उचाइ: ९६ से.मी.
३. बाला निस्कने समय: ७५ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: ११८ दिन
५. औषत उत्पादन: ४.७९ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ४५ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पाते र पहेँलो सिन्दुरे रोग अवरोधी, बाला लागि सकेपछि चल्ने तातो हावा सहन सक्ने, बोरोन कम भएको माटोमा पनि राम्रो उत्पादन दिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १०.६-११.९७
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत:
३. चोकर (bran) प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. चिल्लो खैदिलो बाला
२. ठूलो सेतो रङको पुष्ट दाना
३. अन्य जातभन्दा छिटो पाक्ने



जात: आदित्य

१७) डब्लु के १२०४

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: डब्लु के १२०४
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६४ (२००७)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य पहाड र उच्च पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: हुँदैन, सेतो हुन्छ
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath): गाढा
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity): मध्यम
४. बालाको किसिम: समानान्तर
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सुनौलो पराले
६. दानाको रङ: सेतो
७. दानाको आकार: अण्डाकार

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २८२
२. बोटको औषत उचाइ: ८३ से.मी.
३. बाला निस्कने समय: १२७ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १७९ दिन
५. औषत उत्पादन: ३.४ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ४५ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पहेँलो सिन्दुरे र डढुवा रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.१३
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत: ८.७२
३. चोकर (bran) प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. चौडा, ठाडो परेको, चिल्लो गाढा हरियो पात
२. गाँजको संख्या बढी, अन्य जातको तुलनामा ढिलो पसाउने
३. बालाको डाँठ सिधा



जात: डब्लु के १२०४

१८) गौतम

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: बि एल १८८७
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६१ (२००४)
३. सिफारिश क्षेत्र: समुन्द्र सतहबाट ५०० मी. उचाइसम्मको तराई, टार, र उपत्यका

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: न्यून
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath): नगण्य वा हुँदै नहुने
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity): नगण्य वा हुँदै नहुने
४. बालाको किसिम: फेद र टुप्पामा साँघुरो तथा बिचमा फुकेको (fusiform)
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: गेरु (amber)
७. दानाको आकार: लाम्चो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २४०
२. बोटको औषत उचाइ: ९५ से.मी.
३. बाला निस्कने समय: ७६ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: ११९ दिन
५. औषत उत्पादन: ३.४ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ४४ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: माटोमा बोरोनको कमी भए पनि सहन सक्ने, उच्च तापक्रम सहन सक्ने, पश्चिमा तातो हावा सहन सक्ने, पहेँलो र पाते सिन्दुरे तथा डडुवा रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १४.५९
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत: ८.४९
३. चोकर (bran) प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बाला पाक्ने बेलामा पनि बोट हरियै देखिने
२. बाह्य कर्ण (auricle) गुलाबी रङको हुने



जातः गौतम

१९) बि एल १४७३

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: बि एल १४७३
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०५६ (१९९९)
३. सिफारिश क्षेत्र: समुन्द्र सतहबाट १०००मी. भन्दा कम उचाइ भएको तराई, टार, र उपत्यकाको सिंचित र मध्यम तथा उच्च उर्वराभूमि

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: मध्यम
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath): मध्यम
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity): न्यून
४. बालाको किसिम: फेद र टुप्पामा साँघुरो तथा बिचमा फुकेको (fusiform)
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: सेतो
७. दानाको आकार: लाम्चो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २६०
२. बोटको औषत उचाइ: १०० से.मी.
३. बाला निस्कने समय: ७४ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: ११५ दिन
५. औषत उत्पादन: ४ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ४८ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: बाँझोपन नहुने, खैरो तथा पहेँलो सिन्दुरे र गहुँको पात डुढुवा रोग अवरोधी, र उच्च तापक्रम सहन सक्ने भएकोले ढिलो लगाउँदा पनि राम्रो उत्पादन दिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १२.२
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत:
३. चोकर (bran) प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. झण्डेपातमा रातो रङको बाह्य कर्ण (auricle) हुने



जात: बि एल १४७३

२०) पासाङ्लामु

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: डब्लु के ६८५
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०५४ (१९९७)
३. सिफारिश क्षेत्र: काठमाण्डौ जस्तै हावापानी भएको मध्यपहाड र जुम्ला सरहको हावापानी भएको उच्च पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: हुँदैन, सेतो हुन्छ
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath):
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity):
४. बालाको किसिम: फेद र टुप्पामा साँघुरो तथा बिचमा फुकेको (fusiform)
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो, प्रशस्त मात्रामा काला धब्बा सहित
६. दानाको रङ: गेरु (amber)
७. दानाको आकार: अण्डाकार

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): ३९२
२. बोटको औषत उचाइ: ९४ से.मी.
३. बाला निस्कने समय: १२६ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १७८ दिन
५. औषत उत्पादन: ६.७ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ३४ ग्राम
७. प्रतिकूलता सहने गुण: पहेँलो र पाते सिन्दुरे रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.३
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत: ८.१८
३. चोकर (bran) प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. काला धब्बा सहितको ठाडो पात



जात: पासाङ्लामु

२१) अन्नपूर्ण-४

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एन एल ४९६
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०५१ (१९९४)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य र उच्च पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति:
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath):
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity):
४. बालाको किसिम: फेद र टुप्पामा साँघुरो तथा बिचमा फुकेको (fusiform)
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: गेरु (amber)
७. दानाको आकार: लाम्चो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)


१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर):
२. बोटको औषत उचाइ: ९३ से.मी.
३. बाला निस्कने समय:
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १६१ दिन
५. औषत उत्पादन: ५ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ४६ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: कालोपोके रोग अवरोधी, कम मलखाद प्रयोग हुँदा पनि उत्पादन दिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.८
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत: ७.९२
३. चोकर (bran) प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. पातको तल्लो भाग चिल्लो हुने



जात: अन्नपूर्ण-४

२२) भृकुटी

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम:
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०५१ (१९९४)
३. सिफारिश क्षेत्र: समुन्द्र सतहबाट १००० मीटर उचाइसम्मको तराई, टार र उपत्यका

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति:
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath):
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity):
४. बालाको किसिम:
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: सेतो
७. दानाको आकार: मध्यम लाम्बो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २७१
२. बोटको औषत उचाइ: ८५ से.मी.
३. बाला निस्कने समय: ७८ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२० दिन
५. औषत उत्पादन: ५ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ४४ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पाते र पहेँलो सिन्दुरे तथा डडुवा रोग अवरोधी, उच्च तापक्रम सहन सक्ने भएकोले ढिलो लगाउँदा पनि राम्रो उत्पादन दिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत:
३. चोकर (bran) प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. रातो बाह्य कर्ण (auricle) सहितको गाढा हरियो पात



जात: भृकुटी

२३) नेपाल २९७

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एन एल २९७
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०४२ (१९८५)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति: हुँदैन
२. झण्डेपातको फेदको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath): मध्यम
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity): न्यून
४. बालाको किसिम: फेद र टुप्पामा साँघुरो तथा बिचमा फुकेको (fusiform)
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: सेतो
७. दानाको आकार: लाम्चो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २४५
२. बोटको औषत उचाइ: ९० से.मी.
३. बाला निस्कने समय: ७२ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: ११७ दिन
५. औषत उत्पादन: ५ टन/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ४० ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: ढिलो लगाउँदा पनि राम्रो उत्पादन दिनुको साथै अन्य जातको तुलनामा यसलाई असिनाले कम क्षति पुर्याउने। हाल यो जातले सिन्दुरे रोग अवरोधी क्षमता गुमाएकाले नलगाउन सिफारिश गरिन्छ।

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत:
३. चोकर (bran) प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बाला ठूलो हुने र बालाबाट सजिलै नझर्ने



जात: नेपाल २९७

२४) मुडुले १

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: WK१७१२
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०२१
३. सिफारिश क्षेत्र: उच्च पहाड (१७००-२३०० मिटर उचाइ)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति:
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath):
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity):
४. बालाको किसिम: समानान्तर
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: रातो
७. दानाको आकार: ठूलो (५३.८ ग्राम/हजार दाना)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर):
२. बोटको औषत उचाइ: ८४ सेमी
३. बाला निस्कने समय: १३२ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १८१ दिन
५. औषत उत्पादन: ३०७० केजी/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ५३.८ ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पहेँलो र पात कुहिनेमा मध्यम प्रतिरोधी; डाँठ कुहिने (Ug९९) मा मध्यम संवेदनशील

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १२.२%
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत: १०.१९%
३. फाइबर प्रतिशत: २.२५%

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

- १.
- २.



जात: मुडुले १

२५) कौटिला

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: WK२४२२
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०२१
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य देखि उच्च पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति:
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath):
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity):
४. बालाको किसिम: टुप्पातिर साँघुरिँदै गएको
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: सेतो
७. दानाको आकार: मध्यम (५०.० ग्राम/हजार दाना)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर):
२. बोटको औषत उचाइ: ७८ सेमी
३. बाला निस्कने समय: १०६ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५२ दिन
५. औषत उत्पादन: ३६९० केजी/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ५०.० ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पहेंलो र पात कुहिनेमा मध्यम प्रतिरोधी; डाँठ कुहिने (Ug९९) मा मध्यम संवेदनशील

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ११.२%
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत: ७.६६%
३. फाइबर प्रतिशत: ३.८%

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

- १.
- २.



जात: कौटिला

२६) तिला

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: WK२३७०
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०२१
३. सिफारिश क्षेत्र: उच्च पहाड (१७००-२३०० मिटर उचाइ)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति:
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath):
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity):
४. बालाको किसिम: टुप्पातिर साँघुरिँदै गएको
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: सेतो
७. दानाको आकार: मध्यम (४८.० ग्राम/हजार दाना)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर):
२. बोटको औषत उचाइ: ८५ सेमी
३. बाला निस्कने समय: १४२ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १९१ दिन
५. औषत उत्पादन: ३४३० केजी/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ४८.० ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पहेंलो सिन्दुरे रोगसँग Adelt Plant Resistance APR, डाँठ कुहिने (Ug९९) मा MRMS, पात कुहिनेमा मध्यम संवेदनशील

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १३.१%
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत: १२.९२%
३. फाइबर प्रतिशत: ३.४१%

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

- १.
- २.



जात: तिला

२७) सुर्मा

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: WK२२८६
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०२१
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य देखि उच्च पहाड (१०००-२३०० मिटर उचाइ)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङको उपस्थिति:
२. झण्डेपातको आवरणको चमकपन (glaucosity of flag leaf sheath):
३. बालाको चमकपन (ear glaucosity):
४. बालाको किसिम: टुप्पातिर साँघुरिँदै गएको
५. पाकेको समयमा बालाको रङ: सेतो
६. दानाको रङ: सेतो
७. दानाको आकार: मध्यम (४५.० ग्राम/हजार दाना)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. गाँज संख्या (प्रति वर्ग मीटर):
२. बोटको औषत उचाइ: ७९ सेमी
३. बाला निस्कने समय: ११५ दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: १६० दिन
५. औषत उत्पादन: ३९८२ केजी/हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ४५.० ग्राम
७. प्रतिकुलता सहने गुण: पहेंलो सिन्दुरे रोगसँग Adelt Plant Resistance APR, डाँठ कुहिने (Ug९९) मा मध्यम-संवेदनशील

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १०%
२. सुख्खा ग्लुटेन (dry gluten) प्रतिशत: ९%
३. चोकर (bran) प्रतिशत:

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

- १.
- २.



जात: सुर्मा

२८) हिमगंगा

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनुपूर्व दिइएको नाम: डब्लु.के. ३०२६
२. उन्मोचन सम्बन्धी विशेष जानकारी: २०७७
३. उद्गम देश: मेक्सिको
४. सिफारिस क्षेत्र: उच्च पहाडका क्षेत्र (समुद्र सतह बाट १७०० देखि २३९० मि. सम्म)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङ्गको उपस्थिति: हुदैन
२. पाकेको समयमा बालाको रङ्ग: सेतो
३. दानाको रङ्ग: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाला निस्कने समय: १२६ दिन
२. बाली पाक्न लाग्ने समय: १८१ दिन
३. बोटको औषत उचाइ: ८२ से.मी.
४. औषत उत्पादन: ४.५ मे.टन प्रति हेक्टर
५. अधिकतम उत्पादन: ७७१४ के.जी प्रति हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ४९ ग्राम
७. गाजको संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २८८

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. दानामा जिंकको मात्रा: ५४.१ पी.पी.एम
२. दानामा आर्इरन मात्रा: ३२.३ पी.पी.एम

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. यो जात गहुँको पहेँलो सिन्दुरे, खैरो सिन्दुरे र कालो सिन्दुरे (Ug९९) रोग अवरोधी छ ।
२. यस जातमा जिंक र आइरोनको मात्रा बढी हुने भएकाले, मध्य र उच्च पहाडको किसानहरूको लागि पोषण सुरक्षाको हिसाबले धेरै महत्वपूर्ण रहेको छ ।



जात: हिमगंगा

२९) भेरीगंगा

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनुपूर्व दिइएको नाम: डब्लु.के. २७४८
२. उन्मोचन सम्बन्धी विशेष जानकारी: २०७७
३. उद्गम देश: मेक्सिको
४. सिफारिस क्षेत्र: मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्र (समुद्र सतह बाट १३५० देखि २३०० मि. सम्म)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङ्गको उपस्थिति: हुदैन
२. पाकेको समयमा बालाको रङ्ग: सेतो
३. दानाको रङ्ग: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाला निस्कने समय: १२१ दिन
२. बाली पाक्न लाग्ने समय: १६४ दिन
३. बोटको औषत उचाइ: ९४ से.मी.
४. औषत उत्पादन: ३.४ मे.टन प्रति हेक्टर
५. अधिकतम उत्पादन: ७७१४ के.जी प्रति हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ५१ ग्राम
७. गाजको संख्या (प्रति वर्ग मीटर): ३४५

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. दानामा जिंकको मात्रा: ४८.४ पी.पी.एम
२. दानामा आर्इरन मात्रा: ३६.८ पी.पी.एम

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. यो जात गहुँको पहेँलो सिन्दुरे, खैरो सिन्दुरे र कालो सिन्दुरे (Ug९९) रोग अवरोधी छ ।
२. यस जातमा जिंक र आइरोनको मात्रा बढी हुने भएकाले, मध्य र उच्च पहाडको किसानहरूको लागि पोषण सुरक्षाको हिसाबले धेरै महत्वपूर्ण रहेको छ ।



जात: भेरीगंगा

३०) खुमल शक्ति

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनुपूर्व दिइएको नाम: डब्लु.के. ३०२७
२. उन्मोचन सम्बन्धी विशेष जानकारी: २०७७
३. उद्गम देश: मेक्सिको
४. सिफारिस क्षेत्र: मध्य पहाडका विशेषत अर्सेचित भूभाग (समुद्र सतह बाट १००० देखि १७०० मि. सम्म)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. झण्डेपातको बाह्य कर्ण (auricle) मा बैजनी रङ्गको उपस्थिति: हुदैन
२. पाकेको समयमा बालाको रङ्ग: सेतो
३. दानाको रङ्ग: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाला निस्कने समय: ११५ दिन
२. बाली पाक्न लाग्ने समय: १६५ दिन
३. बोटको औषत उचाइ: ९२ से.मी.
४. औषत उत्पादन: ५.०९ मे.टन प्रति हेक्टर
५. अधिकतम उत्पादन: ८११५ के.जी प्रति हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: ५५ ग्राम
७. गाजको संख्या (प्रति वर्ग मीटर): २७५

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. दानामा जिंकको मात्रा: ३९.४ पी.पी.एम
२. दानामा आर्इरन मात्रा: ३२.९ पी.पी.एम

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. यो जात गहुँको पहेँलो सिन्दुरे, खैरो सिन्दुरे र कालो सिन्दुरे (Ug९९) रोग अवरोधी छ ।
२. यस जातमा जिंक र आइरोनको मात्रा बढी हुने भएकाले, मध्य र उच्च पहाडको किसानहरूको लागि पोषण सुरक्षाको हिसाबले धेरै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
३. डब्लु.के. १२०४ (WK १२०४) जातको विकल्पको रूपमा उन्मोचन गरिएको छ ।



जात: खुमल शक्ति



मकैका जातहरू

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| १) रामपुर हाईब्रिड-२ | १०) अरूण-३ | १९) मनकामना-५ |
| २) रामपुर हाईब्रिड-४ | ११) अरूण-४ | २०) मनकामना-६ |
| ३) रामपुर हाईब्रिड-६ | १२) अरूण-६ | २१) मनकामना-७ |
| ४) रामपुर हाईब्रिड-८ | १३) खुमल हाइब्रिड मकै-२ | २२) पोषिलो मकै-१ |
| ५) रामपुर हाईब्रिड-१० | १४) रेसुङ्गा कम्पोजिट | २३) शितला |
| ६) रामपुर हाईब्रिड-१२ | १५) गुल्मी-२ | २४) देउती |
| ७) रामपुर हाईब्रिड-१४ | १६) मनकामना-१ | २५) गणेश-१ |
| ८) रामपुर हाईब्रिड-१६ | १७) मनकामना-३ | २६) गणेश-२ |
| ९) अरूण-२ | १८) मनकामना-४ | २७) रामपुर कम्पोजिट |

१) रामपुर हाईब्रिड-२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आरएमएल ४/एनएमएल २
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६९ (२०१२)
३. सिफारिस क्षेत्र र ऋतु: नारायणी नदी पूर्वको तराई र भित्री मधेश

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: बेसारे पहेलो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint), बाङ्गो टिङ्गो खालको लाइन भएको (irregular rows)
३. घोगाको बनावट: लम्बाइ मध्यम (लम्बाई १३.२ से.मी. र व्यास ४.६ से.मी.)
४. धानचमराको रङ: बैजनी (purple)
५. जुंगाको रङ: गुलाबी (pink)
६. पातको आकार: चौडा, केही तेर्सो खालको (flat and semi-horizontal)
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: २०३ से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: ११३ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय: ६६ दिन
४. पचास प्रतिशत जुंगा निस्कन लाग्ने समय: ७१ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १३५ दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ७.०५ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ३४९ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: रोग र कीरा अवरोधक

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ७.५९
२. च्याखला र पिठोको अनुपात: ४:१
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पशुपन्छीको दानाका साथै मानिसको खाना

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. एकदम मोटो डाँठ (robust), नढल्ने
२. गाढा हरियो पात, घोगाहरू मोटो, लम्बाई मध्यम खालको र टुप्पा खोस्टाले टम्म छोपेको



जात: रामपुर हाईब्रिड-२

२) रामपुर हाईब्रिड-४

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आरएमएल ३२ / आरएमएल १७
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७३ (२०१६)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: समुन्द्र सतहवाट ७०० मीटरसम्म उचाइ भएको तराई, भित्री मधेश लगायतका क्षेत्रमा हिउँदै सिजनको लागि

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: सुन्तला रंगको पहेलो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint), सोझो लाइन (regular rows)
३. घोगाको बनावट: लाम्चो, करिब ४० प्रतिशत बोटहरूमा दुईवटा घोगा लाग्ने
४. धानचमराको रङ: बैजनी (purple)
५. जुँगाको रङ: गुलाबी (pink)
६. पातको आकार: चौडा, केही ठाडो खालको (semi-vertical)
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: १७८.२ से.मी.
२. बोटको फेदवाट घोगासम्मको उचाइ: ९१.६ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय: ६९ दिन
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ७२ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४५ दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ६.८ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ३००.२९ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: रोग र कीरा सहन सक्ने र केही हदसम्म खडेरी पनि सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ११.०८
२. च्याङ्गला र पिठोको अनुपात: ४:१
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पशुपन्छीको दाना साथै मानिसको खानामा प्रयोग गर्न सकिने

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. मकै पाके पनि ढोड र पात हरियै रहने, एउटै बोटमा प्रायः दुईवटा घोगा लाग्ने
२. गाढा हरियो पात, पातहरू ठाडो (erect), घोगाहरू लाम्चो र टुप्पा खोस्टाले टम्म छोपेको



जात: रामपुर हाईब्रिड-४

३) रामपुर हाईब्रिड-६

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आरएमएल ४ / आरएमएल १७
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७३ (२०१६)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: समुन्द्र सतहवाट ७०० मीटरसम्म उचाइ भएको तराई, भित्री मधेश लगायतका क्षेत्रमा हिउँदे सिजनको लागि

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: फिक्का पहेलो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: लाम्चो (cylindrical)
४. धानचमराको रङ: हल्का बैजनी (slightly purple)
५. जुँगाको रङ: गुलाबी (pink)
६. पातको आकार: चौडा र ठाडो खालको (flat and erect)
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: १३८ से.मी.
२. बोटको फेदवाट घोगासम्मको उचाइ: ७१ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय: ६० दिन
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ६४ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४० दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ६.८ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ३५८.५ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: रोग र कीरा साथै केही हदसम्म खडेरी पनि सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ८.९३
२. च्याङ्गला र पिठोको अनुपात: ४:१
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पशुपन्छीको दानाका साथै मानिसको खाना

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. पात केही फिक्का हरियो (light green)
२. दाना बेसारे पहेलो रङका, घोगामा दानाको हार बाङ्गोटिङ्गो खालको र घोगाको लम्बाइ मध्यम
३. मकै पाके पनि ढोड र पातहरू हरियै रहने (stay green character)



जात: रामपुर हाईब्रिड-६

४) रामपुर हाईब्रिड-८

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: सिएएच १५१
२. उन्मोचन भएको वर्ष: प्रस्तावित
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: तराई, भित्री मधेश तथा तल्लो पहाड (समुन्द्री सतहबाट ८०० देखि १८०० मीटरसम्म)

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: पहेलो
२. दानाको किसिम: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: अर्ध बेलना तथा अर्ध सोली आकार (conico cylindrical)
४. धानचमराको रङ: गुलाबी
५. जुँगाको रङ: गुलाबी
६. पातको आकार: मझौला तथा ठाडो परेको
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: १८३.६६ से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: ८६ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय: ६२ दिन (वसन्ते), १११ दिन (हिउँदै)
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ६४ दिन (वसन्ते), ११५ दिन (हिउँदै)
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: ११० दिन (वसन्ते), १५५ दिन (हिउँदै)
६. औषत उत्पादन: ११.४ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ३२५.२५ ग्राम
८. प्रतिकुलता सहने गुण: उच्च तापक्रम सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. च्याखला र पीठोको अनुपात:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, भुटेर तथा उसिनेर

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. घोगामा हारहरू अनियमित
२. मकै पाकी सकेपछि पनि पात हरियो



जात: रामपुर हाईब्रिड-८

५) रामपुर हाईब्रिड-१०

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: सिएएच १५३
२. उन्मोचन भएको वर्ष: प्रस्तावित
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: तराई, भित्री मधेश तथा तल्लो पहाड (समुन्द्री सतहबाट ८०० देखि १८०० मीटरसम्म)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रंग: सुन्तला पहेलो
२. दानाको किसिम: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: अर्ध बेलना तथा अर्ध सोली आकार (conico cylindrical)
४. धानचमराको रङ: गुलाबी
५. जुँगाको रङ: गुलाबी
६. पातको आकार: मझौला तथा ठाडो परेको
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: १८० से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: ७० से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय: ७७ दिन (वसन्ते), १०९ दिन (हिउँदै)
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ७८ दिन (वसन्ते), ११३ दिन (हिउँदै)
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२० दिन (वसन्ते), १६० दिन (हिउँदै)
६. औषत उत्पादन: ११.११ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ३९९ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: उच्च तापक्रम सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. च्याङ्गुला र पीठोको अनुपात:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, भुटेर तथा उसिनेर

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. घोगामा हारहरू अनियमित हुनु
२. मकै पाकी सकेपछि पनि पात हरियो रहनु



जात: रामपुर हाईब्रिड-१०

६) रामपुर हाईब्रिड-१२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: CAH१७१५ / ZH१५४४५
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७९ (२०२२)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: समुन्द्र सतहबाट ७०० मीटरसम्म उचाइ भएको तराई, भित्री मधेश र फैदीका क्षेत्रमा। बसन्त ऋतुको लागि मुख्य सिफारिश; हिउँदे र ग्रीष्म ऋतुमा पनि उपयुक्त।

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: हल्का पहेलो (Faint Yellow)
२. दानाको बनावट: अर्धकडा (Semi-flint), नियमित र मिलेको लाइन (tight regular kernel row)
३. घोगाको बनावट: लाम्चो, टम्म छोपिएको (tight husk cover)
४. धानचमराको रङ: गुलाबी-रातो (Pink red)
५. जुँगाको रङ: गुलाबी-रातो (Pink red)
६. पातको आकार: माथिल्लो कान माथिको पात झुकेको (bending of leaves above the ear)
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो
८. स्टे-ग्रीन गुण (Stay Green Character): छ

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)


१. बोटको औषत उचाइ: हिउँदेमा २२५ से.मी., ग्रीष्ममा २५६ से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: हिउँदेमा १०४ से.मी., ग्रीष्ममा १२९ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धानचमरा निस्कन लाग्ने समय: हिउँदेमा १११ दिन, ग्रीष्ममा ७३ दिन (औषत)
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: हिउँदेमा ११५ दिन, ग्रीष्ममा ७५ दिन (औषत)
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: हिउँदेमा १६०-१६५ दिन, ग्रीष्ममा १२०-१५० दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: हिउँदे तराईमा ११.५ टन/हेक्टर; ग्रीष्म पहाडमा ९.४४ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: २७२.२२ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: गर्मी सहनशील (तापक्रम $> 35^{\circ}\text{C}$ सम्म सहन सक्ने), रोग तथा कीरा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ७.९६
२. क्याल्सियम (mg/१००g): १६७.२३ (सबैभन्दा बढी)
३. च्याङ्गला र पिठोको अनुपात: ५८.१% च्याङ्गला, ३६.८% पिठो (१.५७:१)
४. उपयोगको उपयुक्त तरिका: खाजा (ढिँडो) मा नरम र स्वादिलो; हरियो घोगा पोलेर मीठो; पशुपन्छीको दाना

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. माथिल्लो पात कान तर्फ झुकेको, दाना हल्का पहेलो रङको, अर्धकडा दाना, मिलेको लाइन
२. स्टे-ग्रीन गुण ' बाली पाके पनि पात हरियै रहन्छ
३. घोगा पूर्ण रूपमा खोस्टाले छोपिएको (tight husk cover)
४. गर्मी सहनशील जात ' दक्षिण एसियाको व्यापक वातावरणमा उपयुक्त



जात: रामपुर हाईब्रिड-१२

७) रामपुर हाईब्रिड-१४

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: RML-८६/RML-९६
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७९ (२०२२)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: तराई, भित्री मधेश, फैदी र मध्यपहाड (समुन्द्र सतहबाट १२०० मीटरसम्म)। GLS प्रभावित क्षेत्रबाहेक पूर्वदिखि पश्चिमसम्म सबै ऋतुमा उपयुक्त।

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: पहेलो
२. दानाको बनावट: अर्धकडा (Semi-flint)
३. घोगाको बनावट: लाम्चो, बहु घोगा लाग्ने (prolific)
४. धानचमराको रङ: सेतो (White)
५. जुँगाको रङ: सेतो (White)
६. पातको आकार: फराकिलो पात (wide leaf blade), उच्च छत्र क्षेत्र (high canopy area), झुकेको पात (pendent)
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: हिउँदेमा १९६ से.मी., ग्रीष्ममा २३८ से.मी.
२. बोटको फेदवाट घोगासम्मको उचाइ: हिउँदेमा ८६ से.मी., ग्रीष्ममा ११९ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धानचमरा निस्कन लाग्ने समय: हिउँदेमा ११८ दिन, ग्रीष्ममा ७९ दिन (औषत)
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: हिउँदेमा १२१ दिन, ग्रीष्ममा ८२ दिन (औषत)
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: हिउँदेमा १५५-१७० दिन, ग्रीष्ममा १२०-१४५ दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ६.८५ टन/हेक्टर (संयुक्त औषत); हिउँदे तराईमा ७.१ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: २५६.१४ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: प्रमुख पातका रोगहरूमा (TLB, SLB, BLSB) मध्यम प्रतिरोधी; डाँठ किराको क्षति तुलनात्मक रूपमा कम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ७.६३
२. फस्फोरस (mg/१००g): ९७.६४
३. च्याङ्गला र पिठोको अनुपात: ५८.७% च्याङ्गला, ३६.१% पिठो (१.६३:१)
४. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पशुपन्छीको दाना साथै मानिसको खानामा प्रयोग गर्न सकिने; घाँस र साइलेजको लागि पनि उपयुक्त

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. फराकिलो पात र उच्च छत्र क्षेत्र ' अन्य जातभन्दा पहिचान गर्न सजिलो
२. धानचमरा र जुँगाको रङ सेतो; डाँठ र बोट गुलाबी रङको
३. घोगाहरू लाम्चो र खोस्टाले राम्रोसँग छोपिएको
४. GLS प्रभावित क्षेत्रमा लगाउन उपयुक्त छैन



जात: रामपुर हाईब्रिड-१४

८) रामपुर हाईब्रिड-१६

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: RML-९५/RML-९६
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७९ (२०२२)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: तराई, भित्री मधेश, फैंदी र मध्यपहाड (समुन्द्र सतहबाट १२०० मीटरसम्म)। GLS प्रभावित क्षेत्रबाहेक पूर्वदिखि पश्चिमसम्म सबै ऋतुमा उपयुक्त।

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: पहेलो
२. दानाको बनावट: अर्धकडा (Semi-flint)
३. घोगाको बनावट: बहु घोगा लाग्ने (prolific ears), अग्लो बोट
४. धानचमराको रङ: गुलाबी (Pink)
५. जुँगाको रङ: गुलाबी (Pink)
६. पातको आकार: अर्धठाडो (Semi-erect)
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: हिउँदेमा १९४ से.मी., ग्रीष्ममा २३२ से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: हिउँदेमा ८७ से.मी., ग्रीष्ममा ११६ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धानचमरा निस्कन लाग्ने समय: हिउँदेमा ११७ दिन, ग्रीष्ममा ८० दिन (औषत)
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: हिउँदेमा ११९ दिन, ग्रीष्ममा ८४ दिन (औषत)
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: हिउँदेमा १६०-१७५ दिन, ग्रीष्ममा १२५-१५० दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ७.१५ टन/हेक्टर (संयुक्त औषत); हिउँदे तराईमा ७.१ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: २९९.४० ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: प्रमुख पातका रोगहरूमा मध्यम प्रतिरोधी; GLS प्रति काभ्रे जस्ता हट-स्पट क्षेत्रमा संवेदनशील

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ७.६८
२. क्याल्सियम (mg/१००g): १०७.४७
३. च्याङ्गला र पिठोको अनुपात: ५९.२% च्याङ्गला, ३५.६% पिठो (१.६६:१)
४. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पशुपन्छीको दाना साथै मानिसको खानामा प्रयोग गर्न सकिने; घाँस र साइलेजको लागि पनि उपयुक्त

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. एउटै बोटमा बहु घोगा लाग्ने (prolific) गुण प्रमुख पहिचान
२. धानचमरा र जुँगाको रङ गुलाबी; डाँठ र बोट गुलाबी रङको
३. अग्लो बोट, अर्धठाडो पात
४. GLS प्रभावित क्षेत्र (जस्तै काभ्रेपलाञ्चोक) मा लगाउन सिफारिश गरिँदैन



जात: रामपुर हाईब्रिड-१६

९) अरुण-२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: युएनसिएसि २४२ X फिलिपिन्स डीएमआर
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०३९ (१९८९)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: तराई र मध्य पहाड (समुन्द्री सतहबाट १००० मीटरभन्दा कम उचाइमा)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: पहेलो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: अर्ध वेलना तथा अर्ध सोली आकारको, टुप्पासम्म खोस्टाले छोपेको
४. धानचमराको रङ: रातो र सेतो मिश्रित
५. जुँगाको रङ: अमला रङ र गुलाबी मिश्रित
६. पातको आकार: मझौला तथा आधा झुकेको
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: १४०-२०० से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: १५१ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय:
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ४०-४५ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: ८०-९० दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: २.२ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ३२१ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: सुख्खा सहन सक्ने, तातो सहन सक्ने (३८ डिग्री सेल्सीयससम्म)

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. च्याङ्गला र पिठोको अनुपात:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर खाने, बेबी कर्नको लागि सिफारिश गरिएको जात, आटो, ढिँडो खान सकिने, वर्षको तीन खेती गरिने ठाउँको लागि उपयुक्त

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बोट होच्चो हुने, नढल्ने
२. खोया २५ देखि ३० प्रतिशत रातो र बाँकी सेतो हुने



जात: अरुण-२

१०) अरूण-३

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: अरूण-१ इभि
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७२ (२०१५)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: मध्यपश्चिमदेखि पूर्वको तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाड; तराई र भित्री मधेशमा हिउँदै र वसन्त तथा मध्य पहाडमा गृष्म ऋतुमा खेती गर्न सकिने

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: सेतो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: मध्यम (medium)
४. धानचमराको रङ: हल्का रातो र सेतो मिश्रित गुलाबी (pinky light red and white mix)
५. जुँगाको रङ: गुलाबी र अमला मिश्रित (pink and amala mix)
६. पातको आकार: चौडा र अलिकति नुघेको (broad and droopy/slightly curve)
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: १९४ से.मी.
२. बोटको फेदवाट घोगासम्मको उचाइ: १०५ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय:
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ५४ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: ८०-९० दिन (गृष्म ऋतुमा)
६. औषत उत्पादन क्षमता: ३.९ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: २९२.८ ग्राम
८. प्रतिकुलता सहने गुण: पातको डुदुवा रोग अवरोधी तथा डुवान, सुख्खा, चिसो, र तातो सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १०.८३
२. च्याङ्गला र पिठोको अनुपात: ३.१:१
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: भुटेर, ढिँडो वा च्याखला पकाएर, उसिनेर खान सकिने

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. पात केही घुमेको हुन्छ
२. धानचमरामा धानको संख्या बाक्लो, जुँगा बैजनी रङ बिहीन हुन्छ



जात: अरुण-३

११) अरूण-४

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: अरूण-४
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७२ (२०१५)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: मध्यपश्चिमदेखि पूर्वको तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाड; तराई र भित्री मधेशमा हिउँदै र वसन्त तथा मध्य पहाडमा गृष्म ऋतुमा खेती गर्न सकिने

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: पहेलो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: मध्यम सोली आकारको (cylindrical medium)
४. धानचमराको रङ: हल्का रातो र सेतो मिश्रित गुलाबी (pinky light red and white mix)
५. जुँगाको रङ: रातो रातो मिश्रित (reddish mix)
६. पातको आकार: बेस्करी घुमेको (strongly curved)
७. पातको मूल नसाको रङ: हरियो हरियो सेतो (greenish white)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: २०० से.मी.
२. बोटको फेदवाट घोगासम्मको उचाइ: १०७ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय:
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ५४ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: ८०-९० दिन (गृष्म ऋतुमा)
६. औषत उत्पादन क्षमता: ४.२ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ३२२ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: डुवान, सुख्खा, चिसो, र तातो सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.५५
२. च्याखला र पिठोको अनुपात: ३.६:१
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, भुटेर, ढिँडो वा च्याखला पकाएर, उसिनेर खान सकिने

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. धानचमराका हाँगा केही घुमेका र धानको संख्या बाक्लो
२. जुँगामा बैजनी रङको उपस्थिति हुने



जात: अरुण-४

१२) अरूण-६

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: पुल-१७ इ
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७२ (२०१५)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: मध्यपश्चिमदेखि पूर्वको तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाड; तराई र भित्री मधेशमा हिउँदै र वसन्त तथा मध्य पहाडमा गृष्म ऋतुमा खेती गर्न सकिने

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: पहेलो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: लामो सोली आकारको (cylindrical long)
४. धानचमराको रङ: हल्का रातो र सेतो मिश्रित गुलाबी (pinkish light red and white mix)
५. जुँगाको रङ: रातो रातो मिश्रित (reddish mix)
६. पातको आकार: बेस्करी घुमेको (strongly curved)
७. पातको मूल नसाको रङ: हरियो हरियो सेतो (greenish white)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: १४६-२०९ से.मी.
२. बोटको फेदवाट घोगासम्मको उचाइ: ९२ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय:
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ५१ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: ७५-८० दिन (गृष्म ऋतुमा)
६. औषत उत्पादन क्षमता: ३.५ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: २५२.६ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: पातको डुदुवा रोग अवरोधी तथा डुवान, सुख्खा, चिसो, र तातो सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १०.९२
२. च्याङ्गला र पिठोको अनुपात: ३.१:१
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, भुटेर, ढिँडो वा च्याख्ला पकाएर, उसिनेर खान सकिने

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. सवैभन्दा छिटो पाक्ने जात भएकाले पछि सुख्खा भए पनि फरक नपर्ने
२. धानचमरामा धानको संख्या बाक्लो



जात: अरुण-६

१३) खुमल हाइब्रिड मकै-२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: के वाई एम-३३ / के वाई एम-३५
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७१ (२०१४)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: मध्य पहाडी क्षेत्रमा वर्षा याममा र तराई तथा भित्री मधेशमा हिउँदे याममा

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: पहेलो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: बेलना आकारको
४. धानचमराको रङ: हल्का रातो र सेतो मिश्रित गुलाबी (pinkish light red and white mix)
५. जुँगाको रङ: रातो रातो मिश्रित (reddish mix)
६. पातको आकार: बेस्करी घुमेको (strongly curved)
७. पातको मूल नसाको रङ: हरियो हरियो सेतो (greenish white)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: १५८ से.मी. (हिउँदे), २३२ से.मी. (वर्षायाम)
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: ५३ से.मी. (हिउँदे), ११५ से.मी. (वर्षायाम)
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय: ८३ दिन (हिउँदे), ६७ दिन (वर्षायाम)
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ८६ दिन (हिउँदे), ६९ दिन (वर्षायाम)
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५२ दिन (हिउँदे), १३८ दिन (वर्षायाम)
६. औषत उत्पादन क्षमता: ९.०८ टन/हेक्टर (हिउँदे), ८.५ टन/हेक्टर (वर्षायाम)
७. हजार दानाको तौल: ३२०.६ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: पातमा लाग्ने रोग gray leaf spot र northern leaf blight सहन सक्ने, परागसेचनको समयमा हल्का सुख्खा पनि सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ७.३२
२. च्याङ्गला र पिठोको अनुपात:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, भुटेर, ढिँडो वा च्याङ्गला पकाएर, उसिनेर खान सकिने

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. अन्य जातको तुलनामा यो जातको जुँगा छिटो विकास हुन्छ र लामो हुन्छ
२. कुनै कुनै घोगाको खोस्टाको टुप्पामा पात देखा पर्ने
३. मकै पाक्सकेपछि पनि पात हरियै रहने



जात: खुमल हाइब्रिड मर्के-२

१४) रेसुङ्गा कम्पोजिट

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: रेसुङ्गा कम्पोजिट
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७१ (२०१४)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: मध्य तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको ७०० देखि १४०० मीटर उचाइसम्मको पहाडी क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: पहेलो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: लामो र मोटो (लम्बाइ १७ से.मी.)
४. धानचमराको रङ:
५. जुँगाको रङ:
६. पातको आकार: १०१.६ से.मी. लामो तथा १०.१ से.मी. चौडा घुमेको पात
७. पातको मूल नसाको रङ:

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: २६० से.मी.
२. बोटको फेदवाट घोगासम्मको उचाइ: १४९ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय: ६५ दिन
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ६९ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२७ दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ५.२ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ३७८ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: बोट दहो हुने र सितिमिति नढल्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १२.२६
२. च्याखला र पिठोको अनुपात:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, भुटेर, आटो (च्याखला) बनाएर

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. मकै पाकीसक्दा पनि पात हरियै रहने
२. तल माथि नभै समान उचाइमा घोगा लाग्ने

११) गुल्मी-२

क. पञ्जीकरण सम्बन्धी जानकारी

१. पञ्जीकरण हुनु पूर्व दिइएको नाम: गुल्मी-२
२. पञ्जीकरण भएको वर्ष: २०७१ (२०१४)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लाको ७०० देखि १४०० मीटर उचाइसम्म

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: चम्किलो पहेलो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: लामो र मोटो (लम्बाइ १८.७ से.मी.)
४. धानचमराको रङ:
५. जुँगाको रङ:
६. पातको आकार: ९४.५ से.मी. लामो तथा ९.१ से.मी. चौडा, घुमेको पात
७. पातको मूल नसाको रङ:

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: २८२ से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: १६१ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय: ६६ दिन
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ७१ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२५ दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ५.४ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ३८९ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: कम मलखादको प्रयोगमा पनि राम्रो उत्पादन दिने; पात थोप्ले, पात डडुवा, र बोट कुहिने रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १२.५५
२. च्याखला र पिठोको अनुपात:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, भुटेर, आटो (च्याखला) बनाएर

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. मकै पाकीसक्दा पनि पात हरियै रहने

१५) मनकामना-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: नदिइएको, नेपालका स्थानीय र विदेशी गरी १९ लाईनको सम्मिश्रण
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०४४ (१९८७)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: मध्य पहाड, हिउँदमा तराई र भित्री मधेशमा पनि लगाउन सकिने

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: सेतो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: अर्ध बेलना तथा अर्ध सोली आकारको, टुप्पासम्म खोस्टाले छोपेको
४. धानचमराको रङ: गुलाबी र सेतो मिश्रित
५. जुँगाको रङ: गुलाबी र सेतो मिश्रित
६. पातको आकार: मझौला तथा आधा झुकेको
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: १८८-२१५ से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: १०९ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय:
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ७३-१०५ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२०-१३० दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ४ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल:
८. प्रतिकूलता सहने गुण: सेते रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. च्याङ्गुला र पिठोको अनुपात: २.५:१
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, भुटेर, उसिनेर, च्याङ्गुला, तथा पिठो, आदि

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. कसिएका घोगा



जात: मनकामना-१

१६) मनकामना-३

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: पपुलेशन २२ सि ८
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०५९ (२००२)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको १००० मीटरदेखि १७०० मीटर उचाइसम्मको मध्य पहाडी क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: दूधे सेतो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: अर्ध बेलना तथा अर्ध सोली आकारको, ठूलो र खोस्टाले टुप्पासम्म छोपेको
४. धानचमराको रङ: सेतो र गुलाबी मिश्रित
५. जुँगाको रङ: पहेलो र गुलाबी मिश्रित
६. पातको आकार: मझौला तथा आधा घुमेको (recurved)
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: २३५ से.मी.
२. बोटको फेदवाट घोगासम्मको उचाइ: १२१ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय:
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ६८ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४२ दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ५.५ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ३७७ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: पात डड्ने तथा घोगा कुहिने रोग सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १०.२
२. च्याङ्गला र पिठोको अनुपात:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, भुटेर, उसिनेर, च्याखला, ढिँडो बनाएर, आदि

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. कसिएका घोगा हुने
२. भाँच्ने वेलामा पनि हरियो रहने



जात: मनकामना-३

१७) मनकामना-४

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: पपुलेशन-४५ सी-१०
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६५ (२००८)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: पूर्वदिखि पश्चिमसम्म १६०० मीटरभन्दा कम उचाइको मध्य पहाड

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: पहेलो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: अर्ध बेलना तथा अर्ध सोली आकार (conico cylindrical)
४. धानचमराको रङ: हल्का रातो तथा सेतो मिश्रित
५. जुँगाको रङ: हल्का रातो तथा सेतो मिश्रित
६. पातको आकार: मझौला तथा आधा झुकेको
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: १७० से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: १३१ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय:
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ७३ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४०-१४५ दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ५.३ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ३५९ ग्राम
८. प्रतिकुलता सहने गुण: खैरो धब्बे रोग सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.४४
२. च्याखला र पिठोको अनुपात: २.०७:१
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: कर्न फ्लेक्सको लागि उपयुक्त, पोलेर, भुटेर, च्याङ्गला, पिठो, आटो

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. मोटो डाँठ हुने, नढल्ने



जात: मनकामना-४

१८) मनकामना-५

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: हिल पुल सेतो
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६६ (२०१०)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: कर्णाली पूर्वको मध्यपहाडी क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: सेतो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: अर्ध बेलना तथा अर्ध सोली आकार (conico cylindrical)
४. धानचमराको रङ: मिश्रित (गुलाबी ७५% तथा सेतो २५%)
५. जुँगाको रङ: मिश्रित (गुलाबी ८५% र सेतो १५%)
६. पातको आकार: मझौला तथा आधा झुकेको
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: २५० से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: १३१ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय:
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ७४ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४०-१४५ दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ५.२७ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ३५९ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: खैरो धब्बे रोग सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.८५
२. च्याङ्गुला र पिठोको अनुपात:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, उसिनेर, भुटेर, आटो, च्याँखला, ढिँडो

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. भाँच्ने बेलासम्म पात हरियो रहने, मोटो डाँठ हुने, नढल्ने



जात: मनकामना-५

१९) मनकामना-६

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: हिल पुल पहेलो
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६६ (२०१०)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: पूर्व र मध्यपश्चिमको पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: पहेलो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: अर्ध बेलना तथा अर्ध सोली आकार (conico cylindrical)
४. धानचमराको रङ: सेतो / गुलाबी (white/pink)
५. जुँगाको रङ: सेतो / गुलाबी (white/pink)
६. पातको आकार: मझौला तथा आधा झुकेको
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो वा हरित सेतो (white or greenish white)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: २३७ से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: १२३ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय:
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ७३ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४०-१४५ दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ५.३४ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ३६५ ग्राम
८. प्रतिकुलता सहने गुण: पात तथा डाँठमा लाग्ने धब्बे रोग सहन सक्ने, नढल्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १०.१९
२. च्याखला र पिठोको अनुपात:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, उसिनेर, भुटेर, आटो, च्याङ्गला, ढिँडो

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. भाँच्ने वेलासम्म हरियो रहने, नढल्ने



जात: मनकामना-६

२०) मनकामना-७

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनुपूर्व दिइएको नाम: एक्रोस ९९४२/एक्रोस ९९४४
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७४ (२०१८)
३. सिफारिस क्षेत्र: मध्य पहाड

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ्ग: सेतो,
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint),
३. बोटको औषत उचाइ: २३९ से.मी.

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. पचास प्रतिशत जुंगा निस्कन लाग्ने समय: ७९ दिन,
२. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५८ दिन,
३. औषत उत्पादन: ६.४५८ मे.टन प्रति हेक्टर,
४. हजार दानाको तौल: ३४१ ग्राम

घ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. किराहरु जस्तै गवारो र फौजी किरा र रोगहरु जस्तै पात डडुवा, ढाठ कुहिने रोग र पातमा लाग्ने खैरो थोप्ले रोगको लागि केहि हद सम्म प्रतिरोधक छ।
२. माथिलो भेगको सिंचाई नहुने क्षेत्र तथा बारीको लागि उपयुक्त हुन्छ र चिस्यान पनि सहन सक्छ।



जात: मनकामना-७

२१) पोषिलो मकै-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एस ९९ टिएलडब्लु क्युएच जिएवि
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६५ (२००८)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: पूर्वदिखि पश्चिमसम्म १६०० मीटरभन्दा कम उचाइको मध्य पहाड

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: सेतो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: अर्ध बेलना तथा अर्ध सोली आकार (conico cylindrical)
४. धानचमराको रङ: रातो तथा सेतो मिश्रित
५. जुँगाको रङ: रातो तथा सेतो मिश्रित
६. पातको आकार: मझौला तथा आधा झुकेको
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: २१० से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: १११ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय:
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ६९ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४५-१५५ दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ५.३ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: २९७ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण:

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ११.५६ (लाईसिन ०.३२%, र ट्रिप्टोफान ०.२%)
२. च्याखला र पिठोको अनुपात:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, भुटेर, उसिनेर, आदि

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. मकै पाक्दा समेत पात हरियो रहने, स्थानीय जात भन्दा मिठो स्वाद, लाईसिन र ट्रिप्टोफानको मात्रा अरु जातमा भन्दा दोब्बर



जात: पोषिलो मकै-१

२२) शितला

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: पपुलेशन ४४ सी १०
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६३ (२००६)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: सेतो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: अर्ध बेलना तथा अर्ध सोली आकार (conico cylindrical)
४. धानचमराको रङ: सेतो र गुलाबी मिश्रित
५. जुंगाको रङ: सेतो र गुलाबी मिश्रित
६. पातको आकार: मभौला तथा आधा भुकेको
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो र गुलाबी मिश्रित

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: २३७ से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: ११८ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय:
४. पचास प्रतिशत जुंगा निस्कन लाग्ने समय: ७२ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १३०-१३५ दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ६.०८ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ४०१ ग्राम
८. प्रतिकुलता सहने गुण: पातको डढुवा रोग र खैरो धब्बे रोग सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ११.०
२. च्याखला र पिठोको अनुपात: २.१:१
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, भुटेर, उसिनेर, च्याखला, ढिंडो, आदि

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. नढल्ने र बाली पाकी सक्दा पनि पात हरियै रहने



जात: शितला

२३) देउती

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: जेड् एम ६२१
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६३ (२००६)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: मध्यपहाड

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: सेतो
२. दानाको बनावट: थाप्लो अलिअलि कुच्चिएको (semi flint)
३. घोगाको बनावट:
४. धानचमराको रङ: गुलाबी रङ मिश्रित
५. जुँगाको रङ: फिक्का गुलाबी
६. पातको आकार: घुमेको (recurved)
७. पातको मूल नसाको रङ:

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)


१. बोटको औषत उचाइ: २४० से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: ११३ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय: ७६ दिन
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ७९ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १३०-१३५ दिन (मध्य पहाड), १४५-१५० दिन (उच्च पहाड)
६. औषत उत्पादन क्षमता: ५.७ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल:
८. प्रतिकूलता सहने गुण: पातको ढढुवा रोग (tursicum leaf blight) सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ११.५
२. च्याखला र पिठोको अनुपात: २:१
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, भुटेर, उसिनेर, च्याखला, ढिँडो, र पशुपन्छीको दाना

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. पाकी सकेपछि पनि बोट हरियै रहने, नढल्ने



जात: देउती

२४) गणेश-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: पुल ९ ए
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०५४ (१९९७)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: उच्च पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: दूध सेतो
२. दानाको बनावट: ठूलो, थाप्लो नकुच्चिएकोदेखि अलिअलि कुच्चिएकोसम्म
३. घोगाको बनावट: अर्ध बेलना तथा अर्ध सोली आकार
४. धानचमराको रङ: सेतो र गुलाबी मिश्रित (७०% सेतो र ३०% गुलाबी)
५. जुँगाको रङ: सेतो र गुलाबी मिश्रित (६०% सेतो र ४०% गुलाबी)
६. पातको आकार: मझौला तथा आधा घुमेको
७. पातको मूल नसाको रङ: हल्का सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: २५०-२८० से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: १४८ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय:
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ९८ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १७५ दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ५ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ३५० ग्राम
८. प्रतिकुलता सहने गुण: पात डड्ने (turcicum leaf blight) रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ९.७
२. च्याखला र पिठोको अनुपात: ५४:३१
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, भुटेर, उसिनेर, च्याखला, ढिँडो बनाएर, आदि

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. नढल्ने, भाँच्ने बेलामा पनि पात हरियो रहने



जात: गणेश-१

२५) गणेश-२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: नदिइएको, नेपालका स्थानीय र विदेशी गरी १८ लाईनको सम्मिश्रण
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०४६ (१९८९)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: उच्च पहाड (हिउँदमा तराई र भित्री मधेशमा पनि लगाउन सकिने)

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: पहेलो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको गोलो (flint)
३. घोगाको बनावट: अर्ध बेलना तथा अर्ध सोली आकारको
४. धानचमराको रङ: सेतो र गुलाबी मिश्रित
५. जुँगाको रङ: सेतो र गुलाबी मिश्रित
६. पातको आकार: मझौला तथा आधा झुकेको
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: २०५ से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: १२० से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय:
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ७५ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: १५०-१८० दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ३.५ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल:
८. प्रतिकूलता सहने गुण: पात डड्ने (turcicum leaf blight) रोग अवरोधी, कम मलिलो जग्गामा राम्रो उत्पादन दिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ८.८
२. च्याखला र पिठोको अनुपात:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, भुटेर, उसिनेर, आदि

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. नढल्ने, भाँच्ने बेलामा पनि पात हरियो रहने



जात: गणेश-२

२६) रामपुर कम्पोजिट

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: थाई कम्पोजिट १ X सुवान १
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०३२ (१९७५)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: तराई, भित्री मधेश, बेसी, र मध्य पहाड

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. दानाको रङ: पहेलो
२. दानाको बनावट: थाप्लो नकुच्चिएको (flint)
३. घोगाको बनावट: अर्ध वेलना तथा अर्ध सोली आकारको
४. धानचमराको रङ: गुलाबी र सेतो मिश्रित
५. जुँगाको रङ: गुलाबी र सेतो मिश्रित
६. पातको आकार: मझौला तथा आधा झुकेको
७. पातको मूल नसाको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: २१०-२२० से.मी.
२. बोटको फेदबाट घोगासम्मको उचाइ: १०८ से.मी.
३. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय:
४. पचास प्रतिशत जुँगा निस्कन लाग्ने समय: ५५ दिन
५. बाली पाक्न लाग्ने समय: ११०-११५ दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ४.४ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ३८९ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: सेते रोग सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. च्याङ्गला र पिठोको अनुपात:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: पोलेर, भुटेर, पिठो, आटो तथा उसिनेर

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. कसिएका घोगा र चम्किलो पहेलो दाना



जात: रामपुर कम्पोजिट



आलुका जातहरू

- | | |
|--------------------|------------------|
| १) कुफ्री सिन्दुरी | ९) खुमल रातो-४ |
| २) कुफ्री ज्योति | १०) खुमल विकास |
| ३) खुमल सेतो-१ | ११) खुमल उपहार |
| ४) खुमल रातो-२ | १२) खुमल लक्ष्मी |
| ५) खुमल उज्यालो | १३) आइ पि वाई-८ |
| ६) जनकदेव | १४) टि पि एस-१ |
| ७) डेजिरी | १५) टि पि एस-२ |
| ८) खुमल सेतो- ३ | |

१) कुफ्री सिन्दुरी

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी



१. पैतृक पहिचान: कुफ्री रेड x कुफ्री कुन्दन = सि. १४०
२. जातीय श्रोत: केन्द्रीय आलु अनुसन्धान संस्थान, सिमला भारत
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई तथा भित्री मधेश

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको आकार: अग्लो, ठाडो र खुल्ला किसिमको
२. डाँठको किसिम: संख्यामा थोरै, रंग एकनासको, डाँठको मोटाई मझौला खालको
३. पातको किसिम: खुल्ला किसिमको, सतह खुम्चिएको र सानो आकारको
४. फूलको रंग: हल्का रातो र सेतो टुप्पा भएको
५. दानाको किसिम र रङ: गोलो, रातो बोक्रा र गुदी हल्का पहेँलो, आँखाको गहिराई मझौला प्रकारको

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाली तयार हुने समय: ११० देखि १३० दिन
२. प्रति बोट डाँठ संख्या: सरदर ५ प्रति बोट
३. प्रति बोट दाना संख्या: सरदर ९-१२ प्रति बोट
४. सुषुप्त अवस्था: लामो (१२ हप्ता)
५. औषत उत्पादन: २०-३० टन/हेक्टर
६. प्रतिकूलता सहने गुण: ऐजेरु नलाग्ने, अगौँदै डढुवा केही सहन सक्ने, डढुवा रोग लाग्ने, पात दोब्रिने भाइरस रोग सहन सक्ने
७. हावापानी अनुकूलता: अन्य जातको तुलनामा सुख्खा तथा खडेरी केहि सहन सक्ने
८. अन्य विशेषताहरू: कम मलिलो जमिनबाट पनि सन्तोषजनक उत्पादन लिन सकिने, भण्डारण क्षमता तुलनात्मक रूपमा राम्रो



जात: कुफ्री सिन्दुरी

२) कुफ्री ज्योति

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. पैतृक पहिचान: ३०६९d (४) x २८१४ a (१) = SLBZ३८९- (b)
२. जातीय श्रोत: केन्द्रीय आलु अनुसन्धान संस्थान, सिमला, भारत
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको आकार: मध्यम, अग्लो र गाँजिएको
२. डाँठको किसिम: मोटो र संख्यामा मध्यम
३. पातको किसिम: चिप्लो र चमकदार सतह
४. फूलको रंग: सेतो
५. दानाको किसिम र रङ: अण्डाकार, ठूलो, बोक्रा चिल्लो र हल्का सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाली तयार हुने समय: उच्च पहाडमा ११०-१२० दिन र मध्य पहाडमा १००-११० दिन
२. प्रति बोट डाँठ संख्या: सरदर ५ प्रति बोट
३. प्रति बोट दाना संख्या: सरदर ७ प्रति बोट
४. सुषुप्त अवस्था: सामान्यतया १२ हप्ता (मध्यम)
५. औषत उत्पादन: २०-२५ टन/हेक्टर
६. प्रतिकूलता सहने गुण: ऐजेरु नलाग्ने, अगौटे डडुवा सामान्य अवरोधक, केहि बर्ष अगाडी सम्म डडुवा अवरोधक भनेर चिनीए पनि हाल लाग्न शुरू भएको ।
७. अन्य विशेषताहरू: तराई, मध्य तथा उच्च पहाडी सबै क्षेत्रमा समेत खेती गर्न सकिने । मनसुन वाली र शरद वालीका रुपमा पनि उत्पादन लिन सकिने ।



जात: कुफ्री ज्योति

३) खुमल सेतो-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी



१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम (सिप): सिप ७२००८८
२. नेपाल भित्रिएको वर्ष: सन् १९८२/८३
३. उन्मोचन भएको वर्ष: सन् १९९९ (वि.सं. २०५६)
४. पैतृक पहिचान: MP१६१३७७.२३ x B६५=५- = Atlantic x Huinkul
५. जातीय श्रोत: अन्तराष्ट्रिय आलुवाली केन्द्र, लिमा, पेरु
६. सिफारिश क्षेत्र: तराई तथा भित्री मधेश देखि उच्च पहाडसम्म

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको आकार: मध्यम खालको र फैलिएको
२. डाँठको किसिम: मसिना, ५-७ प्रति बोट
३. पातको किसिम: खुल्ला, हल्का हरियो
४. फूलको रंग: सेतो रंगको, लामो दिनमा मात्र फुल्ने तर थोरै संख्यामा
५. दानाको किसिम र रङ: सेतो र गुदिको रंग पनि सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाली तयार हुने समय: १०० देखि १२० दिन (मध्यम)
२. प्रति बोट डाँठ संख्या: सरदर ५ प्रति बोट
३. प्रति बोट दाना संख्या: सरदर १० प्रतिबोट
४. सुषुप्त अवस्था: करिब ८ हप्ता (मध्यम)
५. औषत उत्पादन: २५ टन प्रति हेक्टर
६. प्रतिकूलता सहने गुण: ऐजेरु अवरोधक, डडुवा सहन सक्ने, पात दोब्रिने भाइरस अवरोधक
७. अन्य विशेषताहरू: असिना र सुख्खा केही हदसम्म सहन सक्ने।



जात: खुमल सेतो

४) खुमल रातो-२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. नेपाल भित्रिएको वर्ष: सन् १९५९ (अन्तराष्ट्रिय आलुवाली केन्द्र, लिमा पेरुबाट)
२. उन्मोचन भएको वर्ष: सन् १९९९ (वि. सं. २०५६)
३. पैतृक पहिचान: MUS १३६.६ x ३३४५D (१) x २) २२८८)
४. जातीय श्रोत: अन्तराष्ट्रिय आलुवाली केन्द्र, लिमा, पेरु

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको आकार: ठाडो किसिमको
२. डाँठको किसिम: थोरै र मध्यम खालको मोटाई, बैजनी रंग
३. पातको किसिम: मध्यम खालको बनोट, सतह खुम्चिएको, हल्का हरियो रंग

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाली तयार हुने समय: १०० देखि १२० दिन (मध्यम)
२. प्रति बोट डाँठ संख्या: सरदर ४ प्रति बोट
३. प्रति बोट दाना संख्या: सरदर ११ प्रति बोट
४. औषत उत्पादन: २०-२५ टन प्रति हेक्टर
५. प्रतिकूलता सहने गुण: ऐजेरु अवरोधक, डडुवा रोग अवरोधक, अगौटे डडुवा रोग केही सहन सक्ने
६. अन्य विशेषताहरू: तराई क्षेत्रमा उन्मोचित अन्य जातहरू भन्दा बढि उत्पादन दिने, आकर्षक दानाको रंग



जात: खुमल रातो

५) खुमल उज्यालो

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: (उपलब्ध छैन)
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०५३ (२००५)
३. सिफारिश क्षेत्र र ऋतु: ३.५/३ देखि ९/३.५ उचाइसम्म; शरद ऋतुमा

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. कन्दको रङ: पहेलो
२. कन्दको छालाको रङ: पहेलो (brown)
३. मुना भएको ठाउँ साँघुरो हुने
४. कन्दको आकार: अण्डाकार (obovate/elliptic), भित्री भाग पहेलो, गुलाबी रङको नाभी
५. कोपिलाको रङ: सेतो
६. पातको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: उपलब्ध छैन
२. पचास प्रतिशत धान चमरा निस्कन लाग्ने समय: ५.५ “ ३ दिन; उत्पादन ३.५ “ ५ टन/हेक्टर
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: ९०-१२० दिन
४. बाली पाक्न लाग्ने समय: ५-७ दिन
५. उत्पादन (शीत ऋतु): ३-४ दिन
६. औषत उत्पादन क्षमता: ३०-१०५ टन/हेक्टर
७. प्रतिकूलता सहने गुण:

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. reducing sugar (शर्करा) प्रतिशत: ९ ३५
३. स्टार्च प्रतिशत:
४. शुष्क पदार्थ प्रतिशत:

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. कन्द पहेलो र reducing sugar को मात्रा थोरै भएकाले उपयुक्त



जात: खुमल उज्यालो

६) जनकदेव

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. नेपाल भित्रिएको वर्ष: सन् १९९० (अन्तराष्ट्रिय आलुवाली केन्द्र (CIP) बाट)
२. उन्मोचन भएको वर्ष: सन् १९९९ (वि. सं. २०५६)
३. पैतृक पहिचान: Atzimba x Desiree = (Urgenta Depeache)
४. जातीय श्रोत: अन्तराष्ट्रिय आलुवाली केन्द्र, लिमा, पेरु
५. सिफारिश क्षेत्र: तराई देखि उच्च पहाडी भेग सम्म

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको आकार: अग्लो
२. डाँठको किसिम: संख्यामा थोरै, मोटो, एकैनासको, बैजनी रंग
३. पातको किसिम: खुल्ला किसिमको, हल्का हरियो, खस्रो सतह
४. फूलको रंग: लामो दिनमा धेरै फुल्ने, बैजनी
५. दानाको किसिम र रङ: मध्यम देखि ठूलो आकारको, रातो बोक्रा, गुदी हल्का पहेलो, आकार लाम्चो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाली तयार हुने समय: १०० देखि १२० दिन (मध्यम)
२. प्रति बोट डाँठ संख्या: सरदर ४ प्रति बोट
३. प्रति बोट दाना संख्या: सरदर ९ प्रति बोट
४. सुषुप्त अवस्था: करिब ८ हप्ता (मध्यम)
५. औषत उत्पादन: २०-२५ टन प्रति हेक्टर
६. प्रतिकूलता सहने गुण: ऐजेरु अवरोधक, डुबुवा सहन सक्ने
७. अन्य विशेषताहरू: भण्डारण क्षमता राम्रो, असिना सहन सक्ने, नेपालका सबै भू-भागमा खेती गर्न सकिने, सुख्खा तथा खडेरीबाट केही बच्न सक्ने।



जात: जनकदेव

७) डेजिरी

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. पैतृक पहिचान: अर्जेन्टा डिपेस्के
२. जातीय श्रोत: नेदरल्याण्डस्
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, उपत्यका तथा मध्य पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बोटको आकार: होचो र फैलिने खालको
२. डाँठको किसिम: मोटो, हल्का रातो रंग
३. पातको किसिम: तुलनात्मक रुपमा साना र रंगिन
४. फूलको रंग: गुलाबी रंगका फूल धेरै फुल्ने
५. दानाको किसिम र रङ: अण्डाकार लामो, बोक्रा रातो, चिप्लो, गुदी पहेँलो, आँखाको गहिराई कम

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाली तयार हुने समय: ८० देखि ९० दिन
२. प्रति बोट डाँठ संख्या: सरदर ४ प्रति बोट
३. प्रति बोट दाना संख्या: सरदर ७ प्रति बोट
४. सुषुप्त अवस्था: छोटो (८ हप्ता भन्दा कम)
५. औषत उत्पादन: १५ देखि २० टन प्रति हेक्टर
६. प्रतिकुलता सहने गुण: डढुवा लाग्ने, पात दोब्रिने भाइरस रोग लाग्ने तर ऐजेरु अवरोधक
७. अन्य विशेषताहरू: तराई, भित्री मधेश, मध्य पहाड तथा उपत्यकाहरू सबै ठाउँहरूमा राम्रो उत्पादन लिन सकिने, अरु जातहरूको तुलनामा छिट्टै तयार हुने



जात: डेजिरी

८) खुमल सेतो- ३

उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. पुरानो नाम: सि.आई.पि ३९४६००.५२
२. नामाकरण गरिएको नाम: खुमल सेतो -३
३. पेडिग्री वा पुर्खा: ३९५२६२.२ X ३९५२९२.३
४. उद्भगम् देश वा उत्पत्ति: पेरु
५. जातिय श्रोत: अन्तराष्ट्रिय आलुबाली केन्द्र, लिमा, पेरु
६. रा.कृ.अ.श्रो.के. मा दर्ता संकेत नम्बर (Accession number): NGRV ०३२०
७. सिफारिस क्षेत्र: तराई देखि मध्यपहाडसम्म (समुद्री सतह देखि १५०० मीटरको उचाइसम्म)

बालीगत विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औसत उचाई: ५० से.मि.
२. औसत डाठको संख्या प्रति बोट: ५
३. रोपेदेखी बाली परिपक्व (तयार) हुन लाग्ने दिन: ११५
४. उत्पादन प्रति हेक्टर: २९.९१ मे.टन.प्रति हे.
५. सुषुप्तावस्था: ७०-८५ दिन

बोटको रुपरंग (Morphological Characters)

१. पात: पातहरू खुल्ला किसिमका, हरिया रंगका, पातहरूको बिचमा ससाना सहायक पातहरू निस्कने
२. डाँठ: मध्यम मोटाइ, गाढा हरियो, डाँठमा हल्का झुस भएको
३. फूल: धेरै फुल्ने, सेतो रंगको, मध्यम व्यस भएका, inflorescence ठुलो आकारको
४. दाना: अण्डाकार, छाला र गुदी क्रिम रंगको
५. आँखा: सतही, समान किसिमले फिजिएका

प्रसोधनयोग्य विशेषताहरू

१. सुख्खा पदार्थ (Dry matter) % : २१.९४%
२. स्पेसिफिक ग्राभिटी (Specific Gravity) : १.०६४
३. रिडिउसिड सुगर Reducing Sugar content (mg/१००g): १४८.६५
४. टोटल सोलुबल सुगर (TSS) ° brix : ४
५. स्टार्च कन्टेन्ट (Starch Content) % : ९.६७३
६. भिटामिन सि (Vitamin C content) $\mu\text{mol/ltr}$: १९.४५
७. Beta carotene (mg/१००g) : १९.२५
८. समग्रमा आलुको गुणस्तर: चिप्सका लागि उपयुक्त



खुमल सेतो- ३

९) खुमल रातो-४

उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. पुरानो नाम: सि.आई.पि ३९२७९७.२२
२. नामाकरण गरिएको नाम: खुमल रातो -४
३. पेडिग्री वा पुर्खा: ३८७५२९.३ X APHRODITE
४. उद्भगम् देश वा उत्पति: पेरु
५. जातिय श्रोत: अन्तराष्ट्रिय आलुबाली केन्द्र, लिमा, पेरु
६. रा.कृ.अ.श्रो.के. मा दर्ता संकेत नम्बर (Accession number): NGRV ०३२९
७. सिफारिस क्षेत्र: मध्यपहाडदेखि उच्चपहाडसम्म (समुद्री सतहबाट ८०० देखि २५०० मीटरको उचाइसम्म)

बालीगत विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औसत उचाई: ५१.१ से.मि.
२. औसत डाठको संख्या प्रति बोट: ६
३. रोपेदेखी बाली परिपक्व (तयार) हुन लाग्ने दिन: ११०
४. उत्पादन प्रति हेक्टर: २७.८४ मे.टन.प्रति हे.
५. सुषुप्तावस्था: ५५-७० दिन

बोटको रूपरंग (Morphological Characters)

१. पात: पातहरू खुल्ला किसिमका, लामो लम्बाई र मध्यम चौडाई भएका, हरिया, पातको नशाहरूमा एन्थोसायनिन पिगमेन्टले गर्दा हल्का कलेजी रंग देखिने
२. डाठ: मध्यम मोटाइ, डाठमा एन्थोसायनिन पिगमेन्टले गर्दा रातो-खैरो रंगको देखिने, चिल्ला झुस नभएका
३. फूल: हल्का निलो-प्याजी रंगका, मध्यम व्यस भएका, inflorescence मध्यम आकारको
४. दाना: अण्डाकार, छाला रातो रंगको, हल्का पहेलो गुदी
५. आँखा: सतही, समान किसिमले फिजिएका

प्रसोधनयोग्य विशेषताहरू

१. सुख्खा पदार्थ (Dry matter) % : २१.३%
२. स्पेसिफिक ग्राभिटी (Specific Gravity) : १.०६१
३. रिडिउसिड सुगर Reducing Sugar content (mg/१००g): ६०.७४५
४. टोटल सोलुबल सुगर (TSS) ° brix : ४
५. स्टार्च कन्टेन्ट (Starch Content) % : ८.८५
६. भिटामिन सि (Vitamin C content) $\mu\text{mol/ltr}$: १८.१७
७. Beta carotene (mg/१००g) : ४.९०
८. समग्रमा आलुको गुणस्तर: चिप्सका लागि उपयुक्त



खुमल रातो-४

१०) खुमल विकास

क. वानस्पतिक स्वरूप

१. बोटको आकार : मध्यम उचाई भएको, वृद्धि अलि-अलि ठाडो भएर जाने
२. डाँठ : मध्यम मोटाई र थोरै रौं भएको, गाढा हरियो रंगको
३. पात : अन्डाकार र हरियो रंगको, एकदम नजिक र भुस भएको
४. फूल : सेतो पत्रमा राता छिर्का भएको, प्रति बोट दुईदेखि चारवटासम्म भूइतर फर्केको पुष्प समूह
५. आलुको दाना : गोला, थेप्चा किसिमका, छाला गाढा रातो भएका, नौनी जस्ता सेतो गुदी भएको

ख. जातीय विशेषता

१. बाली तयार हुने समय : १०० देखि ११० दिनमा तयार
२. डाँठको संख्या : सरदर ३-४ प्रति बोट
३. दानाको संख्या : सरदर ६-८ प्रति बोट
४. शुष्णतावस्था : करिब ६-८ हप्ता
५. सरदर उत्पादन : २०-२५ टन / हेक्टर
६. रोग अवरोधक क्षमता : डडुवा रोग अरु जातमा भन्दा धेरै कम लाग्ने, ऐजेरु रोग नलाग्ने
७. अन्य विशेषताहरू : सुख्खा पदार्थ बढि भएको, सुख्खा तथा खडेरी केहि हदसम्म सहन सक्ने, चिप्स बन्ने उपयोगी गुण भएको
८. सिफारिस भौगोलिक क्षेत्र : मध्यपहाड देखि उच्च पहाडमा लगाउन सकिने



खुमल विकास

११) खुमल उपहार

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: सिआइपी ३८९७४६.२
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७१ (२०१४)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई र मध्य पहाडको १२०० मीटर उचाइसम्म

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बिरुवाको बनावट: मध्यम अग्लो, ठाडो, फैलिने स्वभावको
२. काण्डको किसिम: मोटो, हल्का रातो देखिने
३. पातको किसिम र रङ: बाक्लो, खस्रो गाढा रङको पातहरू
४. फूलको विवरण: बैजनी रङको, धेरै फुल्ने
५. दानाको किसिम र रङ: गोलो वा अण्डाकार, सानोदेखि ठूलोसम्म फल्ने, हल्का रातो र सेतो मिश्रित
६. गुदीको रङ: क्रिम वा सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)


१. बाली तयार हुन लाग्ने समय: १००-१२० दिन
२. बोटको उचाइ: ३०-५० से.मी.
३. प्रति बोट डाँठ (काण्ड) संख्या: २-३
४. प्रति बोट दाना संख्या: ४-५
५. सुषुप्त अवस्था: मध्यम (६-८ हप्ता)
६. औषत उत्पादन: २४ टन/हेक्टर
७. प्रतिकूलता सहने गुण: ढुढुवा रोग सहन सक्ने, भाइरस 'एक्स', 'वाई' र 'भि' अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. सुख्खा पदार्थ प्रतिशत: २१.१
२. स्टार्च प्रतिशत:
३. घुलनशील चिनी (reducing sugar) को मात्रा: २७.६ मि.ग्रा./१०० ग्रा.
४. प्रशोधन गुण: राम्रो (Promising)

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बोट अग्लो, डाँठ मोटो, दानामा बैजनी रङका आँखा



जात: खुमल उपहार

१२) खुमल लक्ष्मी

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: सिआईपी ३८८५७२.१
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६५ (२००८)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य तथा उच्च पहाडी भेग—वर्षे बाली, सुख्खा उच्च पहाडी भेग—मनसुन बाली, तराई तथा भित्री मधेश—शरद तथा हिउँदे बाली

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बिरुवाको बनावट: अग्लो, कम फिजिएको
२. काण्डको किसिम: मध्यम खालको मोटाई, केही मात्रामा रौं र केही रातो देखिने
३. पातको किसिम र रङ: खस्रो सतह र केही लाम्चो आकारको, गाढा हरियो
४. फूलको विवरण: गुलाबी रातो र परागकोष पहेलो रङको, लामो दिनमा धेरै फुल्ने र छोटो दिनमा कम फूल फुल्ने
५. दानाको किसिम र रङ: गोलो, सानोदेखि ठूलोसम्म फल्ने, रातो
६. गुदीको रङ: क्रिम वा सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाली तयार हुन लाग्ने समय: १२०-१४० दिन
२. बोटको उचाइ: ५०-६० से.मी.
३. प्रति बोट डाँठ (काण्ड) संख्या: ३-५
४. प्रति बोट दाना संख्या: १०-१५
५. सुषुप्त अवस्था: मध्यम (६-८ हप्ता)
६. औषत उत्पादन: २४-२८ टन/हेक्टर
७. प्रतिकूलता सहने गुण: ढढुवा र ऐजेरु रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. सुख्खा पदार्थ प्रतिशत: १६.७
२. स्टार्च प्रतिशत:
३. घुलनशील चिनी (reducing sugar) को मात्रा:
४. प्रशोधन गुण:

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. अग्लो र ठाडो स्वभावको बोट तथा डाँठ मोटो र रंगिन
२. रातो र गोलो आकारको आलु र आँखाको गहिराई मध्यम



जात: खुमल लक्ष्मी

१३) आइ पि वाई-८

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: सिआईपी ३८८५७२.४
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६५ (२००८)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई तथा भित्री मधेश

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बिरुवाको बनावट: मध्यम, खुल्ला भाँगिने किसिमको
२. काण्डको किसिम: मध्यम मोटाई, हरियो रङ, केही मात्रामा राँ भएको
३. पातको किसिम र रङ: केही लाम्चिलो (ovate lanceolate), चुच्चो परेको, हरियो रङ, समतल सतह
४. फूलको विवरण: मध्यम बैजनी रङको, छोटो दिनमा थोरै फुल्ने र आलुभेडा फल्ने
५. दानाको किसिम र रङ: मध्यम आकारको, समतल सतह भएको, सेतो
६. गुदीको रङ: सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)



१. बाली तयार हुन लाग्ने समय: ११०-१२० दिन
२. बोटको उचाइ: ४०-५० से.मी.
३. प्रति बोट डाँठ (काण्ड) संख्या: ३-४
४. प्रति बोट दाना संख्या: १०-१२
५. सुषुप्त अवस्था: मध्यम (६-८ हप्ता)
६. औषत उत्पादन: २५-२७ टन/हेक्टर
७. प्रतिकूलता सहने गुण: अगौटे र पछौटे ढढुवा रोग अवरोधक

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. सुख्खा पदार्थ प्रतिशत: १७.१
२. स्टार्च प्रतिशत:
३. घुलनशील चिनी (reducing sugar) को मात्रा:
४. प्रशोधन गुण:

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. मध्यम फैलिने स्वभाव र मध्यम हरियो डाँठ
२. धेरै आलुभेडा फल्ने, सेतो गोलो र मध्यम आँखाको गहिराई र आँखामा केही रातो भएको



जात: आइ पि वाई-८

१४) टि पि एस-१

क. पञ्जीकरण सम्बन्धी जानकारी

१. पञ्जीकरण हुनु पूर्व दिइएको नाम: एचपीएस २/६७
२. पञ्जीकरण भएको वर्ष: २०७१ (२०१४)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई र मध्य पहाडको सिंचित क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बिरुवाको बनावट: ठाडोदेखि मध्यम फैलिने स्वभाव
२. काण्डको किसिम: मोटो, कडा, चौडादेखि गोलो, हल्का रंगीन डाँठ
३. पातको किसिम र रङ: बाक्लो, लामो चौडा, हरियो
४. फूलको विवरण: सेतो बैजनीदेखि हल्का निलोसम्म
५. दानाको किसिम र रङ: गोलो, सेतो
६. गुदीको रङ: हल्का पहेलो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)


१. बाली तयार हुन लाग्ने समय: ११०-१२० दिन
२. बोटको उचाइ: ३५-६० से.मी.
३. प्रति बोट डाँठ (काण्ड) संख्या: ३-४
४. प्रति बोट दाना संख्या: १०-१२
५. सुषुप्त अवस्था: मध्यम (६-८ हप्ता)
६. औषत उत्पादन: ३५-४० टन/हेक्टर
७. प्रतिकूलता सहने गुण: ढुढुवा रोग सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. सुख्खा पदार्थ प्रतिशत: १७.२
२. स्टार्च प्रतिशत:
३. घुलनशील चिनी (reducing sugar) को मात्रा:
४. प्रशोधन गुण: मध्यम चिप्स बन्ने गुण

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बोट मोटो र फैलिने खालको
२. बोटको जरा तथा त्यान्द्रा फैलिने खालको



चित्र ११: टि.पि.एस. १
(एच.पि.एस. २/६७)

जात: टि पि एस-१

१५) टि पि एस-२

क. पञ्जीकरण सम्बन्धी जानकारी

१. पञ्जीकरण हुनु पूर्व दिइएको नाम: एचपीएस ७/६७
२. पञ्जीकरण भएको वर्ष: २०७१ (२०१४)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई र मध्य पहाडको सिंचित क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बिरुवाको बनावट: ठाडो
२. काण्डको किसिम: पातलो, नरम, चौडादेखि गोलो र हल्का रंगीन डाँठ
३. पातको किसिम र रङ: बाक्लो, चिप्लो, चौडा, हरियो
४. फूलको विवरण: सेतो बैजनीदेखि हल्का निलोसम्म
५. दानाको किसिम र रङ: गोलो, सेतो
६. गुदीको रङ: पहेलो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाली तयार हुन लाग्ने समय: ११०-१२० दिन
२. बोटको उचाइ: ३५-६० से.मी.
३. प्रति बोट डाँठ (काण्ड) संख्या: ३-४
४. प्रति बोट दाना संख्या: ९-१०
५. सुषुप्त अवस्था: मध्यम (६-८ हप्ता)
६. औषत उत्पादन: ३०-३५ टन/हेक्टर
७. प्रतिकूलता सहने गुण: ढुढुवा रोग सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. सुख्खा पदार्थ प्रतिशत: १७.३
२. स्टार्च प्रतिशत: १४.२
३. घुलनशील चिनी (reducing sugar) को मात्रा: १८७ मि.ग्रा./१०० ग्रा.
४. प्रशोधन गुण: मध्यम चिप्स बन्ने गुण

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बोट ठाडो, डाँठ पातलो
२. बोटको जरा एक ठाउँमा गुजमुज्ज हुने तथा त्यान्द्रा फैलिने



चित्र १२: टि.पि.एस. २
(एच.पि.एस. ७/६७)

जात: टि पि एस-२



तरकारी बाली

अ. सिमी

- १) त्रिशूली सिमी
- २) चौमासे सिमी

आ. मुला

- १) जात: चालिस दिने
- २) मिनो अर्ली
- ३) प्युठाने रातो

इ. काउली

- १) खुमल ज्यापू
- २) काठमाडौं स्थानीय

ई. रायोको साग

- १) खुमल रातोपात

उ. प्याज

- १) रेड क्रियोल

ऊ. केराउ

- १) सिक्किमे

ए. गोलभेडा

- १) सृजना (वर्णसंकर)
- २) खुमल गोलभेडा हाईब्रिड-२

- ३. खुमल गोलभेडा हाईब्रिड-३

ऐ. सलगम

- १) काठमाडौं रातो

ओ. भन्टा

- १) पोखरा लुकी - १
- २) परवानीपुर सेलेक्सन-१

औ. काँक्रो

- १) भक्तपुर लोकल

अ. सिमी

१) त्रिशूली सिमी

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम:
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०५१ (१९९४)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य र उच्च पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. बीजदलदेखि जमीनसम्मको काण्ड (hypocotyl) को रङ: हरियो
२. बिरुवा अवस्थामा पातको रङ: फिक्का हरियो
३. वयस्क पातको आकार: ११-१५ से.मी. लम्बाई र बीचको सानो पातको चौडाई १२-१६ से.मी.
४. वयस्क पातको रङ: गाढा हरियो
५. काण्डको रङ: असाध्यै धेरै वैजनी रङ सहितको हरियो
६. प्रति भृष्पा फूलको संख्या र रङ: ४-७, सेतो
७. बीउको रङ: फिक्कादेखि गाढा खैरो (कफि रङ)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको विशेषता: एकपछि अर्को गर्दै फल लाग्ने खालको (indeterminate) लहरे तरकारी
२. फूल फुल्न शुरु हुने समय: बीउ रोपेको ४०-५५ दिन
३. कोषाको आकार र रङ: लम्बाई २०-२५ से.मी. र मोटोपन १०.८-११ मि.मी., तौल ११.५-१५.२ ग्रा., हरियो
४. प्रति कोषा बीउको संख्या: ८-१०
५. बाली भित्र्याउने समय: ७०-७५ दिन (हरियो कोषा); १००-१२० दिन (बीउ)
६. औषत उत्पादन: १३-१४ टन/हेक्टर (हरियो कोषा)
७. हजार दानाको तौल: ३३१ ग्राम
८. प्रतिकुलता सहने गुण:

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १.७ मि.ग्रा./१०० ग्राम
२. खनिज पदार्थ प्रतिशत:
३. भिटामिन प्रतिशत:
४. रेशा प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. सिग्मा आकार (J) का कोषा
२. खैरो खैरो सेतो बीउको आँखा (seed hilum)

२) चौमासे सिमी

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: उन्मोचन नभैसकेको राम्रो गुण भएको स्थानीय जात
२. उन्मोचन भएको वर्ष:
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. बीजदलदेखि जमीनसम्मको काण्ड (hypocotyl) को रङ: वैजनी
२. बिरुवा अवस्थामा पातको रङ: फिक्का हरियो
३. वयस्क पातको आकार: १३-१६ से.मी. लम्बाई र बीचको सानो पातको चौडाई १३-१६ से.मी.
४. वयस्क पातको रङ: गाढा हरियो
५. काण्डको रङ: मध्यम वैजनी रङ सहितको हरियो
६. प्रति भृष्पा फूलको संख्या र रङ: ४-७, गुलाबी
७. बीउको रङ: कालो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको विशेषता: एकपछि अर्को गर्दै फल लाग्ने खालको (indeterminate) लहरे तरकारी
२. फूल फुल्न शुरु हुने समय: बीउ रोपेको ४०-५५ दिन
३. कोषाको आकार र रङ: लम्बाई १८-२२ से.मी. र मोटोपन १०.८-१२.१ मि.मी., तौल १०-१५ ग्राम., हरियो
४. प्रति कोषा बीउको संख्या: ८-१०
५. बाली भित्र्याउने समय: ७०-७५ दिन (हरियो कोषा); ९०-१२० दिन (बीउ)
६. औषत उत्पादन: १२-१४ टन/हेक्टर (हरियो कोषा)
७. हजार दानाको तौल: २५८ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: चारै ऋतुमा खेती गर्न सकिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. खनिज पदार्थ प्रतिशत:
३. भिटामिन प्रतिशत:
४. रेशा प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. गुलाबी रङको फूल, सिग्मा आकार (J) को कम चिल्लो कोषा
२. बाहिरबाट हेर्दा कोषामा दाना भएको ठाउँ र नभएको ठाउँ बीचमा बढी खाडल परेको देखिने
३. बीउको बोक्रा कालो तर आँखाको रङ सेतो

आ. मुला

१) चालिस दिने

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम:
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०५१ (१९९४)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई र मध्य पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. बीजदलदेखि जमीनसम्मको काण्ड (hypocotyl) को रङ: फिक्का गुलाबी
२. बिरुवा अवस्थामा पातको रङ: फिक्का हरियो
३. बयस्क बिरुवामा पातको औसत संख्या: १८
४. बयस्क बिरुवामा पातको पोजिसन: ठाडो
५. बयस्क पातको आकार: ४०.७ से.मी. लम्बाई र १५.४ से.मी. चौडाई, आकार दाविलो जस्तो (spatulate)
६. बयस्क पातको रङ: फिक्का हरियो
७. मूल जराको आकार र रङ: तलमाथि दुवैतिर साँघुरो र बिचमा केही फुकेको (elliptic), सेतो
८. फूलको रङ: सेतो
९. बीउको रङ: रातो मिश्रित खैरो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)


१. बोटको औसत उचाइ: ३० से.मी.
२. जरा भित्र्याउने समय: ३५—४५ दिन
३. मूल जराको औसत तौल: १६०—१७० ग्राम
४. औसत उत्पादन: २८ टन/हेक्टर (जरा)
५. प्रतिकूलता सहने गुण:

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. खनिज पदार्थ प्रतिशत:
३. भिटामिन प्रतिशत:
४. रेशा प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. चाँडै उत्पादन लिन सकिने
२. जरा आधा जमिन माथि र आधा जमिन मुनी हुने
३. फूलको डाँठ फिक्का हरियो, थोरै फूल लाग्ने, अन्तरगाँठ छोटो



जात: चालिस दिने

२) मिनो अर्ली

सिफारिस वर्ष: सन् २०४६

जातीय गुणः

१. व्यापक खेती गरिने व्यवसायिक खेतीको लागि लोकप्रिय जात
२. वंशजः जापानीज (Varietal pedigree: Japanese, Daikon)
३. जराको गुणहरू: चिल्लो, लामो, सेतो र माथिल्लो भागमा हलुका हरियो रंग हुने, टुप्पो भागमा तिखारिएको तथा हल्का परो र गुलियो स्वाद भएको
४. पातको गुणहरू: गाढा हरियो, काटिएको किनारा, एक पछि अर्को र बोटसँग तेश्रो दिशामा फैलिने गुणहरू भएको
५. उत्पादकत्व: २६ मे.टन प्रति हेक्टर
६. बाली तयार हुने अवधि: ४५-६० दिन
७. सिफारिस क्षेत्र: तराई, मध्य देखि उच्च पहाडको सिँचित क्षेत्रहरू (३००-२००० मि. उचाई)



मिनो अर्ली

३) प्युठाने रातो

सिफारिस वर्ष: सन् १९९४

जातीय गुण:

१. व्यापक खेती गरिने र एक व्यवसायिक खेतीको लागि लोकप्रिय जात ।
२. वंशज: नेपालको स्थानीय (प्युठान) जात
३. जराको गुणहरू: हल्का घुमेको रातो गुलाबी रंग भएको तर भित्रको गुदी भाग भने सेतो रंगको माथि देखि विस्तारै साँगुरो हुदै गएको आकार हुने र अलि पिरो स्वादको ।
४. पातको गुणहरू: हरियो, काटिएको र नकाटिएको दुवै किसिमको पातको किनारा हुने, पातको तल्लो भागमा चिल्लो काँडा हुने र पातको नशा रातो रंगको हुने ।
५. उत्पादकत्व: ४३ मे.टन प्रति हेक्टर
६. बाली तयार हुने अवधि: ७०-८० दिन
७. स्थानीय जात, एक रूपता नभई अलि फरक गुणहरू देखिने र रोग सहनशील क्षमता कम हुने ।
८. सिफारिस क्षेत्र: मध्य पहाड



मिनो अर्ली

इ. काउली

१) खुमल ज्यापू

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एचआरडी सिएयू ००५
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७२ (२०१५)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य पहाडी क्षेत्र

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. बीजदलदेखि जमीनसम्मको काण्ड (hypocotyl) को रङ: हल्का बैजनी मिश्रित सेतो
२. बिरुवा अवस्थामा पातको रङ: फिक्का हरियो
३. बयस्क बिरुवामा पातको औसत संख्या: २०—२५
४. बयस्क बिरुवामा पातको पोजिसन: सोझै माथितिर उठेको
५. बयस्क बिरुवाको पातको आकार: फेदमा नकाटिएको, काठमाण्डौ लोकलको भन्दा लाम्चो
६. बयस्क बिरुवाको पातको रङ: फिक्का हरियो
७. कोपीको रङ: क्रिम जस्तो सेतो
८. फूलको रङ: हल्का पहेँलो
९. बीउको रङ: खैरो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औसत उचाइ: ७० से.मी.
२. कोपी भित्र्याउने अवधि: ६५—८० दिन
३. कोपीको औसत तौल: ०.९७ कि.ग्रा.
४. औसत उत्पादन: २९.७ टन/हेक्टर
५. प्रतिकूलता सहने गुण: बेमौसमी उत्पादन लिन सकिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. खनिज पदार्थ प्रतिशत:
३. भिटामिन सी को मात्रा: ३६.५८ मि.ग्रा./१०० ग्राम
४. रेशा प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. पातको फेदमा सतह नकाटिएको



जात: खुमल ज्यापू

२) काठमाडौँ स्थानीय

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम:
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०४६ (१९९०)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, पहाड र उच्च पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. बीजदलदेखि जमीनसम्मको काण्ड (hypocotyl) को रङ: गुलाबी मिश्रित हरियो
२. बिरुवा अवस्थामा पातको रङ: फिक्का हरियो
३. बयस्क बिरुवामा पातको औसत संख्या: २९
४. बयस्क बिरुवामा पातको पोजिसन: फैलिएको
५. बयस्क पातको आकार: ५७.४ से.मी. लम्बाई र २०.४ से.मी. चौडाई, टुप्पोपट्टि गोलाकार (obovate)
६. बयस्क पातको रङ: फिक्का हरियो
७. कोपीको रङ: दूधजस्तो सेतो
८. फूलको रङ: पहेँलो
९. बीउको रङ: रातो मिश्रित खैरो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औसत उचाइ: ६८.१ से.मी.
२. कोपी भित्र्याउने अवधि: ११०—१२० दिन
३. कोपीको औसत तौल: २ कि.ग्रा. (१—३ कि.ग्रा.)
४. औसत उत्पादन: २५ टन/हेक्टर (कोपी)
५. प्रतिकूलता सहने गुण: पानी जमेको सहन सक्ने, कालो सडन रोग सहने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. खनिज पदार्थ प्रतिशत:
३. भिटामिन प्रतिशत:
४. रेशा प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. डाँठ र अन्तरगाँठ लामो हुने
२. पातको ब्लेड तल्लो भागमा बिचको नसासम्म काटिएको हुने



जात: काठमाडौँ स्थानीय

ई. रायोको साग

१) खुमल रातोपात

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम:
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०५१ (१९९४)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य र उच्च पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. बीजदलदेखि जमीनसम्मको काण्ड (hypocotyl) को रङ: बैजनी
२. बिरुवा अवस्थामा पातको रङ: बैजनी मिश्रित हरियो
३. बयस्क बिरुवामा पातको औसत संख्या: २७
४. बयस्क बिरुवामा पातको पोजिसन: मध्यम फैलिएको
५. बयस्क बिरुवाको पातको आकार: ५२.२ से.मी. लम्बाई र २०.८ से.मी. चौडाई, टुप्पोपट्टि गोलाकार (obovate)
६. बयस्क बिरुवाको पातको रङ: गाढा हरियो, बैजनी रङको पातको नसा
७. फूलको रङ: पहेँलो
८. बीउको रङ: कालो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औसत उचाइ: १९.९ से.मी.
२. पात टिप्न तयार हुने समय: ६०—७० दिन
३. पातको औसत तौल: ५०—६० ग्राम
४. औसत उत्पादन: २८ टन/हेक्टर (पात)
५. प्रतिकूलता सहने गुण:

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. खनिज पदार्थ प्रतिशत:
३. भिटामिन प्रतिशत:
४. रेशा प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. खुमल चौडापातको तुलनामा डुकु ढिलो निस्कने
२. पुष्पदल कप आकारको हुने



जात: खुमल रातोपात

उ. प्याज

१) रेड क्रियोल

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम:
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०४६ (१९९०)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराईमा कार्तिकदेखि मंसिर, पहाडमा भाद्रदेखि कार्तिक, र उच्च पहाडमा फागुनदेखि चैतसम्म लगाउन सकिने

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. बीजदलदेखि जमीनसम्मको काण्ड (hypocotyl) को रङ: फिक्का हरियो
२. बिरुवा अवस्थामा पातको रङ: फिक्का हरियो
३. बयस्क बिरुवामा पातको औसत संख्या: २५—३०/डाँठ
४. बयस्क बिरुवामा पातको पोजिसन: खुला र ठाडो
५. बयस्क पातको आकार: ३५—५० से.मी. लम्बाई र मध्यम चौडाई
६. बयस्क पातको रङ: गाढा हरियो
७. गानोको रङ: गाढा रातो
८. फूलको रङ: सेतो पुष्पदलको बिचमा मधुरो हरियो धर्का
९. बीउको रङ: कालो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औसत उचाइ: ६५—७० से.मी.
२. गानो भित्र्याउने समय: १५०—१६० दिन
३. गानोको औसत तौल: १००—१२० ग्राम
४. औसत उत्पादन: १५ टन/हेक्टर (गानो)
५. प्रतिकूलता सहने गुण:

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. खनिज पदार्थ प्रतिशत:
३. भिटामिन प्रतिशत:
४. रेशा प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बेर्ना अवस्थामा काण्ड घुमेको
२. सानो घाँटी भएको गानो



जात: रेड क्रियोल

ऊ. केराउ

१) सिक्किम

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम:
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०५१ (१९९४)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, पहाड र उच्च पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. बीजदलदेखि जमीनसम्मको काण्ड (hypocotyl) को रङ: फिक्का हरियो
२. बिरुवा अवस्थामा पातको रङ: गाढा हरियो
३. बयस्क बिरुवामा पातको औसत संख्या: २१५—८३२
४. बयस्क पातको रङ: फिक्का हरियो
५. काण्डको रङ: हरियोमा हल्का बैजनी मिसिएको
६. प्रति भुष्पा फूलको संख्या र रङ: १—२, सेतो
७. बीउको रङ: पहेँलोमा सेतो मिश्रित (घीउ जस्तो)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)


१. बोटको औसत उचाइ: २०५ से.मी.
२. फूल फुल्न शुरु हुने समय: बीउ रोपेको ८५—९० दिन
३. कोषाको आकार र रङ: लम्बाई ७.९९ से.मी. र मोटोपन १३.३ मि.मी., चिल्लो फिक्का हरियो
४. प्रति कोषा बीउको संख्या: ५—७
५. बाली भित्र्याउने समय: १००—११० दिन (हरियो कोषा); १५०—१६० दिन (बीउ)
६. औसत उत्पादन: १०—१२ टन/हेक्टर (हरियो कोषा)
७. हजार दानाको तौल: २५०—२६० ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण:

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. खनिज पदार्थ प्रतिशत:
३. भिटामिन प्रतिशत:
४. रेशा प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. ढिलो तयार हुने जात
२. ५—७ वटा हाँगा सहितको पाते लता (leaf tendril)
३. कालो गाजल जस्तो बीउको आँखा (seed hilum)



जात: सिक्किमे

ए. गोलभेडा

१) सृजना (वर्णसंकर)

क. पञ्जीकरण सम्बन्धी जानकारी

१. पञ्जीकरण हुनु पूर्व दिइएको नाम: सृजना
२. पञ्जीकरण भएको वर्ष: २०६६ (२०१०)
३. सिफारिश क्षेत्र: ८००—१६०० मी. उचाइको मध्य पहाडी क्षेत्र तथा १५० मी. भन्दा बढी उचाइको तराई

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. बयस्क बिरुवाको पातको आकार:
२. बयस्क बिरुवाको पातको रङ: फिक्का हरियो
३. फूल फुल्न शुरु हुने समय: बीउ रोपेको ३० दिनपछि
४. प्रति भुप्पा फूलको संख्या: १०—१२
५. फूलको रङ: पहेँलो
६. फलको आकार र रङ: अण्डाकार, रातो
७. बीउको रङ:

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औसत उचाइ: ४.७५ मीटर
२. फल टिप्न शुरु हुने समय: ७०—८० दिन
३. फलको औसत तौल: ६०—८० ग्राम
४. औसत उत्पादन: १०५—११० टन/हेक्टर
५. प्रतिकूलता सहने गुण: लामो समयसम्म उत्पादन लिन सकिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. खनिज पदार्थ प्रतिशत:
३. भिटामिन प्रतिशत:
४. कूल घुलनशील ठोस पदार्थ (total soluble solid): ५.२° Brix

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. टुप्पामा चुच्चो परेको मुटु आकारको फल
२. भण्डारण क्षमता उच्च (कोठाको तापक्रममा १४ दिनसम्म राख्न सकिने)



जात: सृजना (वर्णसंकर)

२. खुमल गोलभेंडा हाईब्रिड-२

उन्मोचन वर्ष: वि.सं. २०७७

जातीय गुण:

१. अग्लो बोट तथा पछौटे डडुवा रोग अवरोधक जात
२. औसत फलको तौल: ७०-८० ग्राम
३. उत्पादकत्व: ५५-७५ टन प्रति हेक्टर
४. बाली पाक्ने अवधि: ६६ दिन (पहाड)
५. फलको आकार: हल्का थेप्चिएको गोलो
६. सिफारिस क्षेत्र: तराई देखि मध्य पहाडसम्म



खुमल गोलभेंडा हाईब्रिड-२

३. खुमल गोलभेंडा हाईब्रिड-३

उन्मोचन बर्ष: वि.सं. २०७७

१. अग्लो बोट तथा पछ्यौटे डडुवा रोग अवरोधक जात
२. फलको औसत तौल: ७०-७५ ग्राम
३. उत्पादकत्व: ६०-६५ टन प्रति हेक्टर
४. बाली पाक्ने अवधि: ६५ दिन
५. फलको आकार: गोलो थेप्चिएको र आकर्षक रातो रंग
६. सिफारिस क्षेत्र: तराई देखि मध्य पहाड सम्म



खुमल गोलभेंडा हाईब्रिड-३

ऐ. सलगम

१) काठमाडौँ रातो

उन्मोचन वर्ष: वि.सं. २०७३

जातीय गुण:

१. बिरुवाको वृद्धि विकासको प्रकृति : सिधा ठाडो
२. पातःक्रम काटिएको गाढा हरियो रंग
३. जराको बाहिरी रंग: गाढा कलेजी रातो
४. जराको भित्री रंग: सेतो
५. जराको आकार: थ्याप्चिएको गोलो
६. जराको औसत तौल: १५०-२०० ग्राम
७. बाली तयार हुने अवधि: बीउ रोपेको ५५-६० दिनमा बाली लिन सकिने
८. उत्पादकत्व: ३०.६० टन प्रति हेक्टर
९. सिफारिस क्षेत्र: मध्य पहाड



काठमाडौँ रातो

ओ. भन्टा

१) पोखरा लुकी -१

पञ्जीकरण वर्ष : वि.सं. २०८१

जातीय गुणः

१. रोप्ने समयः मध्य पहाडः फाल्गुन- चैत्र, तल्लो पहाडी क्षेत्र : असोज
२. फल तयार हुने समयः अगौटे
३. फलको स्वादः उत्कृष्ट
४. बोटको उचाईः १५०-१६० से.मी.
५. फूल फुल्ने समयावधिः ४५-५० दिन (बिरुवा रोपे पश्चात)
६. पहिलो फल टिपाईः ६०-६५ दिन (बिरुवा रोपे पश्चात)
७. अन्तिम फल टिपाईः १६०-१७० दिन (बिरुवा रोपे पश्चात)
८. बीउको लागि बाली तयार हुने अवधिः १७०-१८० दिन (५-६ महिना)
९. प्रति बोट औसत फल संख्याः १२-१५
१०. फलको लम्बाईः २०-२५ से.मी
११. फलको तौलः ५०-६० ग्रा.
१२. फलको व्यासः २.५-२.८ से.मी.
१३. फलको आकारः मसिनो र लामो
१४. फलको रंगः हरियो मिश्रित बैजनी रंग
१५. उत्पादकत्वः ६००-७०० ग्रा. प्रति बोट तथा २५-३० मे. टन प्रति हेक्टर
१६. जातः खुला सँचित
१७. रोग प्रतिरोधक क्षमताः ओइलाउने रोग सहने
१८. सिफारिस क्षेत्रः गण्डकी प्रदेशको मध्य-पहाडी क्षेत्र



पोखरा लुकी - १

२) परवानीपुर सेलेक्सन-१

सिफारिस वर्ष: वि.सं. २०७८

जातीय गुण:

१. बोटको उचाई: ६५-७५ से.मि.
२. ५०% फूल फुल्ने समय: ७०-८० दिन
३. पहिलो बाली तयार हुने समय: ९०-९५ दिन
४. अन्तिम बाली लिने अवधि: १७०-१८० दिन
५. फलको लम्बाई: २०-२२ से.मी
६. फलको व्यास: ४.०-४.२ से.मी.
७. फलको गोलाई: १०-१२ से.मी.
८. प्रति फलको तौल: १२०-१३० ग्रा.
९. फलको आकार: लामो
१०. फलको रंग: बैजनी धर्सा भएको
११. उत्पादकत्व: १.२-१.४ किलो तथा २५-२६ टन प्रति हेक्टर
१२. कीरा प्रतिरोधक क्षमता: डाँठ तथा फल गवारो कीरा सहने
१३. सिफारिस क्षेत्र: तराई क्षेत्र



परवानीपुर सेलेक्सन-१

औ. काँक्रो

१) भक्तपुर लोकल

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: उन्मोचन नभैसकेको राम्रो गुण भएको स्थानीय जात
२. उन्मोचन भएको वर्ष: प्रस्तावित
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य र उच्च पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. बीजदलदेखि जमीनसम्मको काण्ड (hypocotyl) को रङ: फिक्का हरियो
२. बिरुवा अवस्थामा पातको रङ: हरियो र छेउ करौटि जस्तो
३. वयस्क पातको आकार: १९-२३ से.मी. लम्बाई र २४-३४ से.मी. चौडाई, पातको डन्ठी १.५-२.५ से.मी. लामो
४. वयस्क पातको रङ: गाढा हरियो
५. मूल लहराको लम्बाई र रङ: २ मी. भन्दा बढी, फिक्का हरियो
६. बीउको रङ: पहेलो पहेलो सेतो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. फूल फुल्न शुरू हुने समय: बेनां सारेको ३५-४० दिनमा भाले फूल फुल्ने र ५५-६० दिनमा पोथी फूल फुल्न शुरू गर्ने, पोथी फूल आठौँदेखि बाह्रौँ नोडमा लाग्ने
२. फलको आकार र रङ: १५-२५ से.मी. लम्बाई र ५-१२ से.मी. व्यास (हरियो सलाद खान) तथा ३०-४५ से.मी. लम्बाई र १०-१५ से.मी. व्यास भएको (पाकेको पहेलो) अचार खान
३. फलको औषत तौल: १५४४-२३६९ ग्राम (सलाद खाने अवस्था), ३५००-४५०० ग्राम (पूर्ण रूपले पाकेको)
४. प्रति फल बीउको संख्या: ३३०-३५०
५. बाली भित्र्याउने समय: ८० -९० दिन (सलाद खान), १२०-१३० दिन (पूर्ण रूपले पाकेको)
६. औषत उत्पादन: २० टन/हेक्टर (हरियो)
७. हजार दाना बीउको तौल : ३४ ग्राम
८. प्रतिकुलता सहने गुण: वेमौसमी खेतीको लागि उपयुक्त, लामो समयसम्म फल लागी रहने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत:
२. खनिज पदार्थ प्रतिशत:
३. भिटामिन प्रतिशत:
४. रेशा प्रतिशत:

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. हरियो फलमा कालो काँडा तथा पाकेको फलमा पहेलो काँडा
२. रङ परिवर्तन नहुने, हल्का सेतो छिरविरै
३. गुलियोपना बढी, मीठो वास्ना आउने



जात: भक्तपुर लोकल





मसला बाली

- १) कपुरकोट हलेदो—२
- २) कपुरकोट हलेदो—१
- ३) कपुरकोट अदुवा—१
- ४) कपुरकोट अदुवा—२

१) कपुरकोट हलेदो-२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: सि आई ०२०९
२. उन्मोचन भएको वर्ष: प्रस्तावित
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई तथा मध्य पहाड

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बिरुवाको वृद्धि र वनावट: ठाडो
२. पातको आकार र रङ: लम्बाई ४३ से.मी. र चौडाई १७ से.मी., अण्डाकार, गाढा हरियो
३. प्रति बिरुवा पात संख्या: १५.०९ (६.५ प्रति गाँज)
४. गानोको रङ: फिक्का खैरो
५. प्रति गाना प्राथमिक छोरा संख्या: ५.८

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाली तयार हुन लाग्ने समय: २४५-२६० दिन
२. बोटको उचाइ: ४२.८२ से.मी.
३. प्रति बोट गाँज संख्या (tillers/clump): २.६६
४. गानोको औषत तौल: ४२५ ग्राम
५. औषत उत्पादन: ३४.०५ टन/हेक्टर
६. बीउ र उत्पादन अनुपात: १:८-१२
७. प्रतिकूलता सहने गुण: लिफ ब्लच सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. बेसार धुलो प्राप्त गर्न सकिने प्रतिशत: १६ ताजा तौलमा र ९४ सुकेको तौलको आधारमा
२. कुर्कुमिन (curcumin) प्रतिशत: २.५८९
३. वासनादार तेल प्रतिशत: ३.७५

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बोट ठाडो, पात अण्डाकार र गाढा हरियो
२. गानोको रङ फिक्का हरियो



कपुरकोट हलेदो २



जात: कपुरकोट हलेदो-२



२) कपुरकोट हलेदो-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: सि आई ९८०१
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७१ (२०१४)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्य पहाडको असिञ्चित पाखोबारी

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बिरुवाको वृद्धि र वनावट: मध्यम ठाडो (semi erect)
२. पातको आकार र रङ: लम्बाई ५५.१ से.मी. र चौडाई १७.४ से.मी., पहेलो हरियो
३. प्रति बिरुवा पात संख्या: ७.४
४. गानोको रङ: फिक्का खैरो रातो
५. प्रति गाना प्राथमिक छोरा संख्या: ४.२

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाली तयार हुन लाग्ने समय: २४५-२६०
२. बोटको उचाइ: ३०.३७ से.मी.
३. प्रति बोट गाँज संख्या (tillers/clump): ३.२३
४. गानोको औषत तौल: २७५ ग्राम
५. औषत उत्पादन: २७.५३ टन/हेक्टर
६. बीउ र उत्पादन अनुपात: १:५-८
७. प्रतिकुलता सहने गुण: लिफ ब्लच सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. बेसार धुलो प्राप्त गर्न सकिने प्रतिशत: १३.८५ ताजा तौलमा र ९२.८ सुकेको तौलको आधारमा
२. कुर्कुमिन (curcumin) प्रतिशत: ४.८८७
३. वासनादार तेल प्रतिशत: ६.६५

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. मध्यम ठाडो बोट, पात elliptic र पहेलो हरियो
२. गानोको रङ फिक्का खैरो रातो



कपुरकोट हलेदो १



जात: कपुरकोट हलेदो-१

३) कपुरकोट अदुवा-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: जेडआई ९७२९
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०५८ (२००९)
३. सिफारिश क्षेत्र: १६०० मीटर उचाइसम्मको भित्री मधेश, मध्य पहाड र बेसी

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाली तयार हुन लाग्ने समय: २२५-२४० दिन
२. उत्पादन क्षमता: २२-३८ मे.टन/ हेक्टर
३. औषत उत्पादन क्षमता: ३० मे.टन/ हेक्टर

ग. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. सुठो प्राप्त गर्न सकिने प्रतिशत: १८ % ताजा तौल आधारमा
२. ओलिओरेजिन (oleoresin) प्रतिशत: ६.१२% सुकेको तौल आधारमा
३. वासनादार तेल प्रतिशत: २.१६ सुकेको तौल आधारमा
४. रेशाको मात्रा: ४% सुकेको तौल आधारमा



जात: कपुरकोट अदुवा-१

४) कपुरकोट अदुवा-२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: जेड आई ८५०२
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७३ (२०१६)
३. सिफारिश क्षेत्र: १६०० मीटर उचाइसम्मको भित्री मधेश, मध्य पहाड र बेसी

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological characters)

१. बिरुवाको वृद्धि र वनावट: ठाडो
२. पातको आकार र रङ: लम्बाई २५ से.मी. र चौडाई २.५ से.मी., गाढा हरियो
३. प्रति बिरुवा पात संख्या: १६५ (१८ प्रति गाँज)
४. गानोको रङ: चाँदी रङ मिसिएको खैरो
५. प्रति गाना प्राथमिक छोरा संख्या: १

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical characters)

१. बाली तयार हुन लाग्ने समय: २४०-२६० दिन
२. बोटको उचाइ: ६२.६२ से.मी.
३. प्रति बोट गाँज संख्या (tillers/clump): ९.२०
४. गानोको औषत तौल: ४२५ ग्राम
५. औषत उत्पादन: ३२.७५ टन/हेक्टर
६. बीउ र उत्पादन अनुपात: १:६.५
७. प्रतिकुलता सहने गुण: गानो कुहिने रोग र पातको धब्बा रोग सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. सुठो प्राप्त गर्न सकिने प्रतिशत: १७.५५ ताजा तौल आधारमा
२. ओलिओरेजिन (oleoresin) प्रतिशत: ७.०५ सुकेको तौल आधारमा
३. वासनादार तेल प्रतिशत: २.०५ सुकेको तौल आधारमा
४. रेशाको मात्रा: ४.५ सुकेको तौल आधारमा

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बोट ठाडो, एकनासको र अग्लो तथा गाढा हरियो पातको रङ
२. सुठो बन्ने क्षमता धेरै भएको
३. वास्नायुक्त तेल र ओलियोरेजिन बढी भएको



जात: कपुरकोट अदुवा-२



दलहन र तेलहन बाली

अ. बोडी

- १) गाजले बोडी
- २) मालेपाटन—१

आ. चना

- १) तारा
- २) अवरोधी

इ. भटमास

- १) पुजा
- २) तरकारी भटमास-१
- ३) खजुरा भटमास - १

ई. मुसुरो

- १) खजुरा मुसुरो-२
- २) खजुरा मुसुरो-३
- ३) खजुरा मुसुरो-४
- ४) महेश्वर भारती
- ५) श्रद्धा कालो मुसुरो
- ६) सिमल

उ. मुड

- १) प्रतिक्षा
- २) कल्याण
- ३) प्रतिज्ञा

ऊ. मास

- १) रामपुर मास
- २) खजुरा मास १

ए. राज्मा

- १) PDR-14

ऐ. रहर

- १) खजुरा रहर - १

ऐ. तोरी

- १) मोरङ्ग तोरी-२
- २) सुर्खेत स्थानिय तोरी-३
- ३) उन्नति
- ४) प्रिति

अ. बोडी

१) गाजले बोडी

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आई टि ९८ के २०५-८
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७३ (२०१७)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश, टार, वेसी तथा मध्य पहाडको समुन्द्र सतहदेखि १००० मीटर उचाइसम्म

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. पातको आकार: टुप्पाको सानो पात गुमोज आकार (sub-globose)
२. पातको रङ: गाढा हरियो
३. कोषाको रङ: फिक्का रातो रातो (pale tan)
४. फूलको रङ: बाहिर पहेलो र भित्र सेतो
५. दानाको रङ: सेतो, आँखाको रङ निलोदेखि कालो
६. दानाको आकार: मृगौला आकारको

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: ६२ से.मी.
२. पचास प्रतिशत फूल फुल्न लाग्ने समय: ४५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: ७८ दिन
४. प्रति बोट कोषा संख्या: ११
५. प्रति कोषा दाना संख्या: १४
६. औषत उत्पादन: १.५४ टन/हेक्टर (बीउ), ३.१ टन/हेक्टर (कोषा)
७. हजार दानाको तौल: १५० ग्राम
८. प्रतिकुलता सहने गुण: पहेलो मोजाईक भाइरस रोग अवरोधी, कीराहरूले क्षति कम गर्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: १९.५६
२. रेशा (fiber) प्रतिशत: २.१५
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: बोडीको दाना तथा दाल पकाएर, हरियो कोषा र बीउ तरकारीको रूपमा

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. दानाको रङ सेतो र आँखाको रङ निलोदेखि कालो (गाजल लगाए जस्तो)
२. छिटो पाक्ने र बढी उत्पादन दिने

२) मालेपाटन-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आई टि ५६ एफ-२०८९-५ हरियो
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६८ (२०११)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाडका टार तथा होचा क्षेत्रहरू (३०० देखि १००० मीटर उचाइसम्म)

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. पातको आकार: तिन पाते
२. पातको रङ: हरियो
३. कोषाको रङ: हरियो
४. फूलको रङ: सेतो र खरानी मिश्रित
५. दानाको रङ: खैरो रातो
६. दानाको आकार: अण्डाकार (oblong)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: ५०-६० से.मी.
२. पचास प्रतिशत फूल फुल्न लाग्ने समय: ५०-६० दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: ७०-१०० दिन
४. प्रति बोट कोषा संख्या: ३०
५. प्रति कोषा दाना संख्या: १३
६. औषत उत्पादन: ०.८-१ टन/हेक्टर (बीउ)
७. हजार दानाको तौल: १४२.५ ग्राम
८. प्रतिकुलता सहने गुण: सुख्खा सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: २१.५८
२. रेशा (fiber) प्रतिशत:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: बोडीको सुकेको दानाको दाल तथा तरकारी, हरियो कोषा तथा कमलो दाना तरकारीको रूपमा

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. होचो जात र झुप्पामा फल लाग्ने
२. पाक्ने बेलासम्म कोषामा रेसा नलाग्ने र छोटो अवधिमा बाली तयार हुने

आ. चना

१) तारा

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आई सि सि एक्स ८४०५०८-३६
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६४ (२००८)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई र मध्य पहाडको वेसी तथा टार

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. पातको आकार: साना (१३ से.मी. भन्दा कम)
२. पातको रङ: ओलिभ जस्तो हरियो
३. कोषाको रङ:
४. फूलको रङ: गाढा गुलाबी
५. दानाको रङ: पहेलो र खैरो मिश्रित
६. दानाको आकार: Ram head

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: ५१ से.मी.
२. पचास प्रतिशत फूल फुल्न लाग्ने समय: ८७ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १३५ दिन
४. प्रति बिरुवा कोषा संख्या: ५१
५. प्रति कोषा दाना संख्या: १.४
६. औषत उत्पादन: १.४ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: २०३ ग्राम
८. प्रतिकुलता सहने गुण: ओइलाउने रोग अवरोधी, सुख्खामा पनि खेती गर्न सकिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: २६.७
२. रेशा (fiber) प्रतिशत:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: दाल, भिजाएर टुसा खाने, सातु, घुगनी, कोहरी, भुटेर खाने, छोला, दालमोठ

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. ओलिभ जस्तो हरियो पात र गाढा गुलाबी फूल
२. पहेलो र खैरो मिश्रित दानाको रङ

२) अवरोधी

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: अवरोधी
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६४ (२००८)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई र मध्य पहाडको वेसी तथा टार

ख. बिरुवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. पातको आकार: सानो
२. पातको रङ: गाढा गुलाबी हरियो
३. कोषाको रङ:
४. फूलको रङ: गाढा गुलाबी
५. दानाको रङ: पहेलो र खैरो मिश्रित
६. दानाको आकार: Ram head

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: ५५ से.मी.
२. पचास प्रतिशत फूल फुल्न लाग्ने समय: ८६ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १३५ दिन
४. प्रति बिरुवा कोषा संख्या: ५३
५. प्रति कोषा दाना संख्या: १.५
६. औषत उत्पादन: १.३ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: १९० ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: ओइलाउने रोग मध्यम अवरोधी, कम उर्वराशक्ति भएको माटोमा पनि उत्पादन गर्न सकिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: २१.३
२. रेशा (fiber) प्रतिशत:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: दाल, भिजाएर टुसा खाने, सातु, घुगनी, कोहरी, भुटेर खाने, छोला, दालमोठ

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. फिक्का हरियो पात र बोट मध्यम, फैलिने
२. गाढा पहेलो र खैरो मिश्रित दानाको रङ

इ. भटमास १) पुजा

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: पि के ४१६
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६३ (२००६)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाड

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. पातको आकार: चौडा
२. पातको रङ: गाढा हरियो
३. कोषाको रङ: खैरो पहेलो
४. फूलको रङ: सेतो
५. दानाको रङ: घिउ जस्तो सेतो
६. दानाको आकार: अण्डाकार

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)


१. बोटको औषत उचाइ: ६० से.मी.
२. पचास प्रतिशत फूल फुल्न लाग्ने समय: ५५ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२५ दिन
४. प्रति बोट कोषा संख्या: ७
५. प्रति कोषा दाना संख्या: २
६. औषत उत्पादन: १.६ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ११५ ग्राम
८. प्रतिकुलता सहने गुण: पहेलो मोजाईक भाइरस व्याक्टेरियाका धब्बा र पहेलो भाइरस रोग अवरोधी, बढी चिस्यानमा पनि खेती गर्न सकिने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ३७.९
२. रेशा (fiber) प्रतिशत:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: बानस्पतिक घिउ, बच्चा र मधुमेह रोगीको कोषा तरकारी, हरियो कोषा तरकारी, लागि खाने परिकार बनाउन, गाईवस्तु र कुखुराको दाना

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. बोट ठाडो र एकै पटक पाक्ने
२. घिउ जस्तो सेतो दानाको रंग
३. फूलको रङ घिउ जस्तो पहेलो सेतो र पात गाढा हरियो



जात: पुजा

२) तरकारी भटमास-१

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: हुवाईचिन # २
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६० (२००४)
३. सिफारिश क्षेत्र: मध्यपहाडी क्षेत्र (८०० मीटरदेखि १५०० मीटरसम्म)

ख. विश्वको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. पातको आकार:
२. पातको रङ: गाढा हरियो
३. कोषाको रङ: गाढा हरियो, पाक्ने बेलामा खैरो कालो
४. फूलको रङ: गुलाबी
५. दानाको रङ: हरियो
६. दानाको आकार: मध्यम ठूलो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)


१. बोटको औसत उचाइ: ४८ से.मी.
२. पचास प्रतिशत फूल फुल्न लाग्ने समय: ५७ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १२० दिन
४. प्रति बोट कोषा संख्या: ३२
५. प्रति कोषा दाना संख्या: २.१
६. औसत उत्पादन: २.३ टन/हेक्टर(विउ), १०.८५ टन/हेक्टर (हरियो कोषा)
७. हजार दानाको तौल:
८. प्रतिकूलता सहने गुण: व्याक्टेरियाका धब्बा र भाइरस रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: ४१
२. रेशा (fiber) प्रतिशत:
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: हरियो कोषा सिधै र सुकेको दाना भिजाएर तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. होचो र दह्रो बोट हुनाले ढल्ने समस्या नहुने
२. बोटको तल्लो भागमा कोषाहरू गुजमुज्ज रूपमा फल्ने
३. पाक्ने बेलामा पात झर्ने र कोषा खैरो कालो हुने



जात: तरकारी भटमास-१

३) खजुरा भटमास - १

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी


१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७९
२. सिफारिस क्षेत्र: तराई देखि मध्यपहाड (समुद्री सतह देखि १००० मि. उचाई सम्म)

ख. बोटको बनावटसँग र बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological and Agronomical Characters)

१. बोटको उचाई: ६६ सेमी
२. फुल फुल्न लाग्ने दिन: ६० दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने दिन: ११५ दिन
४. उत्पादन प्रति हे.: १९७१ किलोग्राम
५. उत्पादन क्षमता प्रति हे.: ३१०० किलोग्राम

ग. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. ब्याक्टेरियल पस्टुल्स र पहेँलो मोजाइक भाइरस प्रतिरोधी,०
२. उच्च बीउ प्रोटीन ४२.८४%
३. तेल सामग्री ११.५१%



भटमास: खजुरा भटमास - १

ई. मुसुरो

१) खजुरा मुसुरो-२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: पी.एल ६३९
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०५६ (१९९९)
३. सिफारिस क्षेत्र: मध्य तथा सुदुरपश्चिमका धान र मकै लगाईने खेत

ख. विश्वको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. पातको आकार:
२. फूलको रङ:
३. दानाको रङ:
४. दालको रङ:

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औसत उचाइ:
२. पचास प्रतिशत फूल फुलन लाग्ने समय:
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १३०-१३८ दिन, औषतमा १३४ दिन
४. प्रति कोषा दाना संख्या:
५. औसत उत्पादन: २.१ मे.टन प्रति हेक्टर
६. हजार दानाको तौल:

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. पौष्टिक तथ्यांक उपलब्ध छैन

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. ओइलाउने तथा सिन्दुरे रोग अवरोधक
२. स्थानिय जातभन्दा ३१ प्रतिशत बढी उत्पादन दिने



जात: खजुरा मुसुरो-२

२) खजुरा मुसुरो-३

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आर एल ४
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७३ (२०१७)
३. सिफारिश क्षेत्र: समुद्री सतहबाट १७०० मीटरसम्मको तराई, भित्री मधेश, र मध्य पहाड

ख. विश्वको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. पातको आकार: ५ देखि ११ से.मी. लामो र ९ देखि १५ वटा साना पात मात्र
२. पातको रङ: गाढा हरियो
३. कोषाको रङ: खैरोदेखि पहेँलो खैरो
४. फूलको रङ: निलो
५. दानाको आकार: सानो, लेन्स आकारको
६. दालको रङ: सुन्तला/रातो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औसत उचाइ: ३३ से.मी.
२. पचास प्रतिशत फूल फुल्न लाग्ने समय: ८३ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४८ दिन
४. प्रति विरुवा कोषा संख्या: ७२
५. प्रति कोषा दाना संख्या: १.९
६. औसत उत्पादन: १.७८ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: १७.३ ग्राम
८. प्रतिकूलता सहने गुण: ओइल्याउने रोग अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: २६.७३
२. रेशा (fiber) प्रतिशत: १.१४
३. सिल्लो दाल प्रतिशत: ५८.३
४. टुक्रा दाल प्रतिशत: २२.९
५. उपयोगको उपयुक्त तरिका: दाल

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. ढिलो पाक्ने, अरु उन्मोचित जातभन्दा उत्पादन धेरै दिने



जात: खजुरा मुसुरो-३

३) खजुरा मुसुरो-४

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आई.एल.एल ७७२३
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७५ (२०१८)
३. सिफारिस क्षेत्र: मध्य तथा सुदुरपश्चिमका तराई: दाङ देखि कञ्चनपुरसम्म १०० देखि ७०० मी. सम्म

ख. विश्वको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. पातको आकार:
२. फूलको रङ: सेतो पत्तामा निलो नशा भएको
३. दानाको रङ: सुन्तला खैरो
४. दालको रङ: सुन्तला

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)


१. बोटको औसत उचाइ: ३३ (२७-३९) से.मी.
२. पचास प्रतिशत फूल फुलन लाग्ने समय: ८७ (६९-१०३) दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १३६ (१२३-१५९) दिन
४. प्रति कोषा दाना संख्या: २ (२-३)
५. औसत उत्पादन: १.०८१ (०.३१०-२.३५२) मे.टन प्रति हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २१.६ (१०-३२) ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीनको मात्रा: २७.३५ प्रतिशत
२. रेशा: १.०५ प्रतिशत
३. फलामको मात्रा: ७९ मि.ग्रा प्रति केजी
४. जिंक: ४५.१ मि.ग्रा प्रति केजी

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. Fusarium ओइलाउने र Stemphyllium blight रोग अवरोधक
२. सिंचाई नभएको उच्च बारी तथा बेसीमा पनि उपयुक्त हुने
३. हरियो लाही किराको प्रकोप सहन सक्ने



जात: खजुरा मुसुरो-४

४) महेश्वर भारती

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: आइ.एल.एल. ७९८२
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६४ (२००७)
३. सिफारिस क्षेत्र: काठमाडौँ उपत्यका वा सो सरहको मध्य पहाडी क्षेत्रको टार तथा बेसी

ख. विश्वको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. पातको आकार: साँघुरा साना पात
२. फूलको रङ: निलो निलो बैजनी
३. दानाको आकार: च्याप्टो/गोलो
४. दानाको रङ: निलो निलो खैरो
५. दालको रङ: ‘

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औसत उचाइ: ३१ से.मी.
२. पचास प्रतिशत फूल फुल्न लाग्ने समय: १११ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १६३ दिन
४. प्रति कोषा दाना संख्या: २
५. औसत उत्पादन: १.४ मे.टन प्रति हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: २१ ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीनको मात्रा: २६.९ प्रतिशत
२. उपयोगको उपयुक्त तरिका: दाल, दालमोठ र भुजिया

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. ओइलाउने र जरा कुहिने रोग अवरोधी
२. खरानी र हरियो रङ मिश्रित साना पात



जात: महेश्वर भारती

५) श्रद्धा कालो मुसुरो

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: कालो मुसुरो
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७७ (२०२०)
३. सिफारिस क्षेत्र:

ख. विश्वको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. पातको आकार:
२. फूलको रङ: निलो
३. दानाको रङ: रातो
४. दालको रङ: कालो

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औसत उचाइ: ३३ (२८-३८) से.मी.
२. पचास प्रतिशत फूल फुलन लाग्ने समय:
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४२ (१२२-१६४) दिन
४. प्रति कोषा दाना संख्या: २ (१.५-२.१)
५. औसत उत्पादन: १.२०८ (०.४१३-२.४०२) मे.टन प्रति हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: १८ (१०-२७) ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीनको मात्रा: २४.९६ प्रतिशत
२. रेशा: ८.६५ प्रतिशत
३. फलाम: ७९ मि.ग्रा प्रति केजी
४. जिंक: ४५.१ मि.ग्रा प्रति केजी

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. Fusarium ओइलाउने र Stemphyllium blight रोग केहि हद सम्म अवरोधक
२. सिंचाई नभएको उच्च बारी तथा बेसीमा पनि उपयुक्त हुने
३. हरियो लाही किराको प्रकोप सहन सक्ने



जात: कालो मुसुरो

६) सिमल

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: एल.जी. ७
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०४६ (१९९०)
३. सिफारिस क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश र मध्यपहाड

ख. विश्वको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. पातको आकार:
२. फूलको रङ:
३. दानाको रङ:
४. दालको रङ:

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)


१. बोटको औसत उचाइ: ३२ से.मी.
२. पचास प्रतिशत फूल फुलन लाग्ने समय:
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: १४३ दिन
४. प्रति कोषा दाना संख्या: २
५. औसत उत्पादन: १.१०२ (अधिकतम ४.१३०) मे.टन प्रति हेक्टर
६. हजार दानाको तौल: १८० ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन: २६.९८ प्रतिशत

ड. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. यो जातलाई धानबालीमा घुसुवा बालीको रूपमा पनि लगाउन सकिन्छ



जात: सिमल

उ. मुड १) प्रतिक्षा

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: भि सी ६३७२ (४५-८-१)
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६३ (२००६)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, चुरे पहाड र मध्यपहाड

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. पातको आकार: चौडा, लामो डाँठ सहितको तिनपाते
२. पातको रङ: गाढा हरियो
३. कोषाको रङ: फिक्का खैरो
४. फूलको रङ: फिक्का पहेलो
५. दानाको रङ: ओलिभ जस्तो हरियो, दानाको आँखाको रङ सेतो
६. दानाको आकार: अण्डाकार (oblong)

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: ५० से.मी.
२. पचास प्रतिशत फूल फुल्न लाग्ने समय: ४२ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: ६३ दिन
४. प्रति बोट कोषा संख्या: १५
५. प्रति कोषा दाना संख्या: ९
६. औषत उत्पादन: ०.६८६ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ४५ ग्राम
८. प्रतिकुलता सहने गुण: पहेलो मोजाईक भाइरस रोग अवरोधी, पातको धब्बाको मध्यम अवरोधी

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: २१.१
२. रेशा (fiber) प्रतिशत: ३.८
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: दाल, दालमोठ

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. कोषा तल झुकेको (dropping)
२. दाना आकर्षक, चम्किलो, ठूलो र कोषा फिक्का खैरो

२) कल्याण

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन हुनु पूर्व दिइएको नाम: भि सी ६३७१-९४
२. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६३ (२००६)
३. सिफारिश क्षेत्र: तराई, चुरे पहाड र मध्यपहाड

ख. बिरूवाको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. पातको आकार: लामो डाँठ सहितको तिनपाते
२. पातको रङ: गाढा हरियो
३. कोषाको रङ: गाढा खैरो
४. फूलको रङ: फिक्का पहेँलो
५. दानाको रङ: ओलिभ जस्तो हरियो, दानाको आँखाको रङ सेतो
६. दानाको आकार: oblong

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. बोटको औषत उचाइ: ३२ से.मी.
२. पचास प्रतिशत फूल फुल्न लाग्ने समय: ४० दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने समय: ६० दिन
४. प्रति बोट कोषा संख्या: १४
५. प्रति कोषा दाना संख्या: १०
६. औषत उत्पादन: ०.६९ टन/हेक्टर
७. हजार दानाको तौल: ४८ ग्राम
८. प्रतिकुलता सहने गुण: पहेँलो मोजाईक भाइरस रोग अवरोधी, सरकोसपोरा (Cercospora) पातको धब्बा, व्याक्टेरियल पातको धब्बा रोग सहन सक्ने

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. प्रोटीन प्रतिशत: २४.२
२. रेशा (fiber) प्रतिशत: ३.२
३. उपयोगको उपयुक्त तरिका: दाल, दालमोठ

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. कोषा ठाडो हुने
२. प्रतिक्षा भन्दा होचो र छिटो पाक्ने

३) प्रतिज्ञा

१. बाली पाक्न लाग्ने दिन: ६५ दिन
२. उत्पादन क्षमता प्रति हे.: २,२२४ किलोग्राम
३. सिफारिस क्षेत्र: तराई देखि मध्यपहाडी क्षेत्रको टार तथा बेसी
४. विशेष गुण: ठुलो आकारको दाना, पहेँलो छिरबिरे रोग नलाग्ने, वर्षात र बसन्त दुवै समयको लागि उपयुक्त, दुई पटकमा नै ८५% उत्पादन लिन सकिने

ऊ. मास

१) रामपुर मास

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७५
२. उद्गम स्थान: नेपाल
३. बंश: बि एल जी ००६७-१
४. सिफारिस क्षेत्र: तराई देखि मध्यपहाड (समुद्री सतह देखि १५०० मि. उचाई सम्म)

ख. विश्वको बनावटसँग र बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological and Agronomical Characters)

१. बोटको उचाई: २८ सेमी
२. फुल फुल्न लाग्ने दिन: ४४ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने दिन: ६४ दिन
४. उत्पादन प्रति हे.: ८८६ किलोग्राम
५. उत्पादन क्षमता प्रति हे.: १४२३ किलोग्राम

ग. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. पहेँलो छिरबिरे रोग कम लाग्ने, वर्षात र बसन्त दुवै समयको लागि उपयुक्त

२) खजुरा मास १

उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७५
२. उद्गम स्थान: नेपाल
३. बंश: बि एल जी ०००३-२-१
४. सिफारिस क्षेत्र: तराई देखि मध्यपहाड (समुद्री सतह देखि १५०० मि. उचाई सम्म)

ख. विश्वको बनावटसँग र बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological and Agronomical Characters)

१. बोटको उचाई: २९ सेमी
२. फुल फुल्न लाग्ने दिन: ४२ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने दिन: ६६ दिन
४. उत्पादन प्रति हे.: ८९४ किलोग्राम
५. उत्पादन क्षमता प्रति हे.: १९३९ किलोग्राम

ग. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. पहेँलो छिरबिरे रोग कम लाग्ने
२. वर्षात र बसन्त दुवै समयको लागि उपयुक्त

ए. राजमा

१) PDR - 14

१. बाली पाकन लाग्ने दिन: ११९ दिन
२. उत्पादन प्रति हे.: १,६८१ केजी/हे.
३. उत्पादन क्षमता प्रति हे.: ३,६९१ केजी/हे.
४. सिफारिस क्षेत्र: तराई-भित्री मधेश, मध्य तथा उच्च पहाड (२३०० मि. सम्म)
५. विशेष गुण: पहुँलो छिरबिरे रोग नलाग्ने, सेतो कपासे तथा एन्ट्राक्नोज रोग सहन सक्ने



PDR-14

ए. रहर

१) खजुरा रहर - १

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी


१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७९
२. सिफारिस क्षेत्र: मध्य देखि पश्चिम तराई

ख. बोटको बनावटसँग र बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological and Agronomical Characters)

१. बोटको उचाई: २६० सेमी
२. फुल फुल्न लाग्ने दिन: १७८ दिन
३. बाली पाक्न लाग्ने दिन: २७४ दिन
४. उत्पादन प्रति हे.: १६८५ किलोग्राम
५. उत्पादन क्षमता प्रति हे.: २८०० किलोग्राम

ग. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. ओइलाउने रोग तथा बांझो मोजाइक रोग सहन सक्ने, बोलुड,
२. हल्का बैजनी मोटल र आकर्षक बीउ,
३. प्रोटीन १८.६३%,
४. तेल/बोसो ११.४९%,
५. कार्बोहाइड्रेट ६४.७०%,
६. तरकारी र दाल दुवैमा उपयुक्त



रहर: खजुरा रहर - १

ऐ. तोरी

१) मोरङ्ग तोरी-२

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७० (२०१३)
२. सिफारिस क्षेत्र: तराई तथा मध्य तराइ

ख. विश्वको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. बीउ अवस्थामा जमिनमुनिको काण्ड (hypocotyl) को रङ:
२. वयस्क विरुवाको पातको आकार: झुण्डिएको झण्डेपात lyrate
३. पातको रङ:
४. दानाको रङ: फिक्का पहेँलो पहेँलो रातो
५. दानाको आकार: गोलो
६. प्रति कोषा दाना संख्या: १३—१८
७. फूल (flower petals) को रङ:
८. कोषाको लम्बाई: ५ से.मी.

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. पचास प्रतिशत फूल फुल्न लाग्ने समय: २९ दिन
२. बाली पाक्न लाग्ने समय: ८३ दिन
३. बोटको औसत उचाइ: ८६.३ से.मी.
४. औसत उत्पादन: ०.७—०.९ मे.टन प्रति हेक्टर
५. हजार दानाको तौल: २.९४ ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. तेल प्राप्ति: ४१.३६ प्रतिशत

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. लामो जरा (१०३ से.मी.) भएकोले सुख्खा सहन सक्ने
२. छिटो पाक्ने, धेरै हागा लाग्ने र मध्यमदेखि अग्लो बोट



Morang Tori -2 (मोरङ तोरी -२)



जात: मोरङ तोरी-२

२) सुर्खेत स्थानीय तोरी-३

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०७१ (२०१४)
२. सिफारिस क्षेत्र: मध्यपश्चिमका तराईका जिल्लाहरू बाँके, बर्दिया, दाङ तथा मध्य पहाडका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र भेरी नदी किनारका क्षेत्रहरू

ख. विश्वको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. बीउ अवस्थामा जमिनमुनिको काण्ड (hypocotyl) को रङ: हरियो सेतो
२. वयस्क विरुवाको पातको आकार: मध्यम
३. पातको रङ: फिक्का हरियो
४. दानाको रङ: फिक्का पहेँलो पहेँलो रातो
५. दानाको आकार: गोलो
६. प्रति कोषा दाना संख्या: १३
७. फूल (flower petals) को रङ: पहेँलो
८. कोषाको लम्बाई: ४.४५ से.मी.

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. पचास प्रतिशत फूल फुल्न लाग्ने समय: ३० दिन
२. बाली पाक्न लाग्ने समय: ८२—१०० दिन
३. बोटको औसत उचाइ: ७९ से.मी.
४. औसत उत्पादन: ०.९०५ मे.टन प्रति हेक्टर
५. हजार दानाको तौल: २.२५ ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. तेल प्राप्ति: ४५.८ प्रतिशत

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. डढुवा र लाही कीरा कम लाग्ने
२. हाँगा फेदको नजिकैबाट आउने र बोट तुलनात्मक रूपमा होचो
३. मूख्य हाँगा तिर झपक कोषा लाग्ने, तुलनात्मक रूपमा कोषाहरू बोटको टुप्पासम्म लाग्ने र चाँडो पाक्ने



जात: सुखैत स्थानीय तोरी-३

३) उन्नति

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६२ (२००५)
२. सिफारिस क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश र कम उचाई भएको उपत्यकाको असिंचित क्षेत्र

ख. विश्वको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. बीउ अवस्थामा जमिनमुनिको काण्ड (hypocotyl) को रङ:
२. वयस्क बिरुवाको पातको आकार:
३. पातको रङ:
४. दानाको रङ: गाढा खैरो
५. दानाको आकार: गोला
६. प्रति कोषा दाना संख्या: १३
७. फूल (flower petals) को रङ:
८. कोषाको लम्बाई:

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. पचास प्रतिशत फूल फुलन लाग्ने समय: ३२ दिन
२. बाली पाक्न लाग्ने समय: ८६ दिन
३. बोटको औसत उचाइ: ८१ से.मी.
४. औसत उत्पादन: १.००४ मे.टन प्रति हेक्टर
५. हजार दानाको तौल: २.९५ ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. तेल प्राप्ति: ४६.६६ प्रतिशत

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. विशेष गुणहरू उल्लेख छैन



उन्नति तोरी (Unnati Tori)

जात: उन्नति

४) प्रिति

क. उन्मोचन सम्बन्धी जानकारी

१. उन्मोचन भएको वर्ष: २०६२ (२००५)
२. सिफारिस क्षेत्र: तराई, भित्री मधेश र कम उचाई भएको उपत्यकाको असिंचित क्षेत्र

ख. विश्वको बनावटसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Morphological Characters)

१. बीउ अवस्थामा जमिनमुनिको काण्ड (hypocotyl) को रङ:
२. वयस्क विरुवाको पातको आकार:
३. पातको रङ:
४. दानाको रङ: गाढा खैरो
५. दानाको आकार: गोली
६. प्रति कोषा दाना संख्या: १४
७. फूल (flower petals) को रङ:
८. कोषाको लम्बाई:

ग. बाली प्रणालीसँग सम्बन्धित विशेषताहरू (Agronomical Characters)

१. पचास प्रतिशत फूल फुलन लाग्ने समय: २६ दिन
२. बाली पाक्न लाग्ने समय: ८३ दिन
३. बोटको औसत उचाइ: ८२ से.मी.
४. औसत उत्पादन: १.२६७ मे.टन प्रति हेक्टर
५. हजार दानाको तौल: २.९५ ग्राम

घ. पौष्टिक तथा अन्य गुण (Nutritional and other qualities)

१. तेल प्राप्ति: ४६.०६ प्रतिशत

ङ. जातीय पहिचान सम्बन्धी विशेष गुणहरू (Special identifying characters)

१. विशेष गुणहरू उल्लेख छैन



प्रीति तोरी (Preeti Tori)

जात: प्रिति



फलफूल बाली

अ. स्याउको जात:

- १) रोयल डेलिसियस (Royal Delicious)
- २) रेड डेलिसियस (Red Delicious)
- ३) रिच-ए रेड डेलिसियस (Rich-A Red Delicious)
- ४) गोल्डेन डेलिसियस (Golden Delicious)

आ. एभोकाडो जात

- १) हास (Hass)
- २) एटिन्जर (Ettinger)
- ३) रिड (Reed)

इ. कागती

- १) सुनकागती-१
- २) सुनकागती-२
- ३) तेहथुम स्थानीय

ई. सुन्तला

- १) खोकु स्थानीय
- २) बाँसखर्क स्थानीय
- ३) पारीपात्ले अगौटे-१

अ. स्याउको जातः

१) रोयल डेलिसियस (Royal Delicious)

क. बोट (वृक्ष) सम्बन्धी विशेषता

१. बोटको उचाई (१५ वर्षमा): ३ — ४.५ मिटर
२. गोलाई (Collar girth): ४८ से.मि.
३. क्यानोपी फैलावट: पूर्व-पश्चिम ३.१ मि. / उत्तर-दक्षिण ३.६ मि.
४. पातको घनत्व: घना (Dense)
५. बोटको बनावट / वृद्धि: ठूलो बोट; हाँगाहरू सिधा माथितिर बढेका

ख. फल सम्बन्धी विशेषता

१. फलको आकार: गोल शोली आकार (Round conical with five crowns), माथि चौडा तल साँघुरो
२. फलको रङ्ग: गाढा रातो रङ्गमा हरिया धर्साहरू (Deep red with green streaks)
३. फलको औसत तौल: १२०—१६० ग्राम
४. फलको छाला: मध्यम बाक्लो, चिल्लो (रेड र गोल्डेनको बिचको)
५. गुदीको रङ्ग र स्वाद: हल्का सेतो गुदी, कसिलो, रसदार, वासनायुक्त र स्वादिलो
६. प्रति के.जी. फल संख्या: ६—८ वटा
७. भण्डारण अवधि: टिप्पापछि लगभग २ महिना (सामान्य तापक्रममा)

ग. फूल तथा फलन सम्बन्धी विशेषता


१. ५०% फूल फुल्ने समय (पात झरेपछि): पात झरेको १२०—१२५ दिनपछि
२. फल पाक्ने समय (फूलेपछि): फूलेको १४०—१५० दिनपछि (भदौको दोश्रो हप्तादेखि पाक्न शुरू)
३. सुप्त अवस्था (Dormant period): ८५—९५ दिन
४. प्रति बोट फल संख्या: ६००—७०० वटा
५. प्रति कोशा/स्पर फल: १—२ वटा

घ. रासायनिक/पोषण सम्बन्धी विशेषता

१. TSS (घुलनशील ठोस पदार्थ): १०.५—११.५ °Brix
२. अम्लता (TA): ०.२८—०.३०
३. TSS/TA अनुपात: ३३—३६
४. Starch Index: ३—४

ड. सिफारिस क्षेत्र तथा विशेष गुण

१. उपयुक्त उचाइ: २०००—३८०० मिटर
२. जलवायु क्षेत्र: नेपालको शीतल तथा सुख्खा शीतोष्ण (Cool and dry temperate) क्षेत्र
३. विशेष पहिचान: गाढा रातो रङ्गमा हरिया धर्साहरू; क्लासिक स्याउको आकार; ५ स्पष्ट क्राउन ; टिप्पा कुरुकुरु (Crunchy); वर्षैपिच्छे फल्ने
४. उत्पादन क्षमता: औसत ८—१३ टन/हेक्टर



स्याउको जात: रोयल डेलिसियस (Royal Delicious)

२) रेड डेलिसियस (Red Delicious)

क. बोट (वृक्ष) सम्बन्धी विशेषता

१. बोटको उचाई (१५ वर्षमा): ३ — ४.५ मिटर
२. गोलाई (Collar girth): ४७ से.मि.
३. क्यानोपी फैलावट: पूर्व-पश्चिम ३.३२ मि. / उत्तर-दक्षिण ३.७४ मि.
४. पातको घनत्व: घना (Dense)
५. बोटको बनावट / वृद्धि: ठूलो बोट, हाँगाहरू माथितिर पातला बढेका

ख. फल सम्बन्धी विशेषता

१. फलको आकार: गोल शोली आकार (Round conical with five crowns), माथि चौडा, तल साँघुरो
२. फलको रङ्ग: रातो (Red)
३. फलको औसत तौल: १२५—१५० ग्राम
४. फलको छाला: बाक्लो, चिल्लो र चम्किलो (Thick, smooth and glossy)
५. गुदीको रङ्ग र स्वाद: क्रीम सेतो गुदी, नरम, गुलियो, वासनायुक्त र रसिलो
६. प्रति के.जी. फल संख्या: ६—८ वटा
७. भण्डारण अवधि: टिप्पापछि लगभग २ महिना (सामान्य तापक्रममा)

ग. फूल तथा फलन सम्बन्धी विशेषता

१. ५०% फूल फुल्ने समय (पात झरेपछि): पात झरेको १२५—१३० दिनपछि
२. फल पाक्ने समय (फूलेपछि): फूलेको १४५—१५५ दिनपछि (भदौ अन्त्यदेखि कार्तिक बीचसम्म)
३. सुप्त अवस्था (Dormant period): ९५—१०० दिन
४. प्रति बोट फल संख्या: ६००—७०० वटा
५. प्रति कोशा/स्पर फल: १—२ वटा

घ. रासायनिक/पोषण सम्बन्धी विशेषता

१. TSS (घुलनशील ठोस पदार्थ): १०.५—११.५ °Brix
२. अम्लता (TA): ०.२७—०.२९
३. TSS/TA अनुपात: ३५—४०
४. Starch Index: ३.५—४.५

ड. सिफारिस क्षेत्र तथा विशेष गुण

१. उपयुक्त उचाइ: २०००—३८०० मिटर
२. जलवायु क्षेत्र: नेपालको शीतल तथा सुख्खा शीतोष्ण (Cool and dry temperate) क्षेत्र
३. विशेष पहिचान: फलको टुप्पामा ५ वटा स्पष्ट चुच्चा; आकर्षक रातो रङ्ग; नेपालमा सबैभन्दा व्यापक रूपमा उत्पादित व्यावसायिक जात
४. उत्पादन क्षमता: औसत ८—१३ टन/हेक्टर



स्याउको जात: रेड डेलिसियस (*Red Delicious*)

३) रिच-ए रेड डेलिसियस (Rich-A Red Delicious)

क. बोट (वृक्ष) सम्बन्धी विशेषता

१. बोटको उचाई (१५ वर्षमा): ३.५ — ४.५ मिटर
२. गोलाई (Collar girth): ६३ से.मि.
३. क्यानोपी फैलावट: पूर्व-पश्चिम ४.१ मि. / उत्तर-दक्षिण ४.२ मि.
४. पातको घनत्व: घना (Dense)
५. बोटको बनावट / वृद्धि: मझौला देखि ठूलो; हाँगा घना फैलिने

ख. फल सम्बन्धी विशेषता

१. फलको आकार: गोल शोली आकार (Round conical with five crowns)
२. फलको रङ्ग: गाढा रातो रङ्गमा मसिना सेता थोप्लाहरू (Dark red with white dots)
३. फलको औसत तौल: १३५—१५५ ग्राम
४. फलको छाला: बाक्लो, चिल्लो (Thick, smooth)
५. गुदीको रङ्ग र स्वाद: क्रीम सेतो गुदी, रसिलो र स्वादिलो
६. प्रति के.जी. फल संख्या: ६—७ वटा
७. भण्डारण अवधि: टिप्पापछि लगभग २ महिना (सामान्य तापक्रममा)

ग. फूल तथा फलन सम्बन्धी विशेषता

१. ५०% फूल फुल्ने समय (पात झरेपछि): पात झरेको ११५—१२० दिनपछि
२. फल पाक्ने समय (फूलेपछि): फूलेको १३५—१४५ दिनपछि (रेड डेलिसियसभन्दा ८—१० दिन अगाडि पाक्छ)
३. सुप्त अवस्था (Dormant period): ८०—९० दिन
४. प्रति बोट फल संख्या: ५००—६०० वटा
५. प्रति कोशा/स्पर फल: १—२ वटा

घ. रासायनिक/पोषण सम्बन्धी विशेषता

१. TSS (घुलनशील ठोस पदार्थ): ११—१२ °Brix
२. अम्लता (TA): ०.२६—०.२८
३. TSS/TA अनुपात: ४०—४५
४. Starch Index: ३—४

ड. सिफारिस क्षेत्र तथा विशेष गुण

१. उपयुक्त उचाइ: २०००—३८०० मिटर
२. जलवायु क्षेत्र: नेपालको शीतल तथा सुख्खा शीतोष्ण (Cool and dry temperate) क्षेत्र
३. विशेष पहिचान: रेड डेलिसियससँग मिल्दोजुल्दो तर फल ठूलो; गाढा रातो रङ्गमा सेता थोप्लाहरू; रङ्ग विकास अरु जातभन्दा छिटो; प्रारम्भिक फलन (रोपेको ३—४ वर्षमा फल)
४. उत्पादन क्षमता: उच्च उत्पादन ८—१२ टन/हेक्टर



स्याउको जात: रिच-ए रेड डेलिसियस (*Rich-A Red Delicious*)

४) गोल्डेन डेलिसियस (Golden Delicious)

क. बोट (वृक्ष) सम्बन्धी विशेषता

१. बोटको उचाई (१५ वर्षमा): ३.५ — ४ मिटर
२. गोलाई (Collar girth): ४६ से.मि.
३. क्यानोपी फैलावट: पूर्व-पश्चिम ३.२ मि. / उत्तर-दक्षिण ३.०२ मि.
४. पातको घनत्व: घना (Dense)
५. बोटको बनावट / वृद्धि: मझौला, हाँगा चारैतर्फ फैलिने

ख. फल सम्बन्धी विशेषता

१. फलको आकार: गोल शोली आकार (Round conical to oblong), स्पष्ट क्राउन नभएको
२. फलको रङ्ग: सुनौलो-पहेँलो (Golden yellow to bright yellow)
३. फलको औसत तौल: ११०—१३५ ग्राम
४. फलको छाला: पातलो, चिल्लो (Thin, smooth)
५. गुदीको रङ्ग र स्वाद: क्रीम रङ्गको गुदी, रसिलो, सुगन्धित र स्वादिष्ट
६. प्रति के.जी. फल संख्या: ७—९ वटा
७. भण्डारण अवधि: टिप्पापछि लगभग १ महिना (सामान्य तापक्रममा)

ग. फूल तथा फलन सम्बन्धी विशेषता

१. ५०% फूल फुल्ने समय (पात झरेपछि): पात झरेको १३०—१४० दिनपछि
२. फल पाक्ने समय (फूलेपछि): फूलेको १५०—१६५ दिनपछि (भदौ अन्त्य / आश्विन पहिलो हप्ता)
३. सुप्त अवस्था (Dormant period): ९०—११० दिन
४. प्रति बोट फल संख्या: ७००—८०० वटा
५. प्रति कोशा/स्पर फल: २—३ वटा

घ. रासायनिक/पोषण सम्बन्धी विशेषता

१. TSS (घुलनशील ठोस पदार्थ): १२—१४ °Brix
२. अम्लता (TA): ०.२६—०.२८
३. TSS/TA अनुपात: ५०—५३
४. Starch Index: ४—५

ड. सिफारिस क्षेत्र तथा विशेष गुण

१. उपयुक्त उचाइ: २०००—३८०० मिटर
२. जलवायु क्षेत्र: नेपालको शीतोष्ण (Temperate) क्षेत्र
३. विशेष पहिचान: डेलिसियस समूहका सबै जातको उत्तम परागकणकर्ता (Best pollinizer); सुनौलो-पहेँलो फल; सुगन्धित सुकेको स्याउ उत्पादनको लागि उत्कृष्ट
४. उत्पादन क्षमता: उच्च फलन (Heavy fruiting); फल छाँट्नु आवश्यक



स्याउको जात: गोल्डेन डेलिसियस (Golden Delicious)

आ. एभोकाडो जात

१) हास (Hass)

क. उत्पत्ति तथा बाली प्रणाली

१. जातीय समूह: ग्वाटेमाला (Guatemalan) | फूल प्रकार: टाइप A
२. उत्पत्ति: विश्वको ८०% एभोकाडो उत्पादन ओगट्ने सबैभन्दा लोकप्रिय जात
३. फुल्ने / फल लाग्ने / पाक्ने समय: फागुन तेस्रो साता → चैत पहिलो साता → मंसिर पहिलो
४. बोटको उचाइ / डाँठ परिधि: ५.५—८.७ मि. / ४९.५—६५ से.मि. । डाँठ सतह: चिल्लो
५. औसत उत्पादन (के.जी/बोट): ३०—९२

ख. फलको विशेषता

१. फलको आकार / रङ (काँचो→पाकेको): साँघुरो अण्डाकार । हरियो → गाढा खैरो-कालो (विशेष पहिचान)
२. फलको छाला: मध्यम मोटाइ / कर्कट जस्तो (Warty/Pebbly) ।
३. गुदीको बनावट / स्वाद: मक्खनजस्तो, रेसारहित, सुनौलो-हरियो रङ । अखरोट स्वाद
४. फलको तौल / अनुपात: २९२ ग्राम । बीउ:छाला: गुदि = १६:१२:७२ । तेल: १८—२०%
५. फल भण्डारण गुण: राम्रो शेल्फ लाइफ; रुखमा लामो समय टिक्छ (Late maturity)

ग. फल तथा बीउ नाप

१. फल लम्बाइ / व्यास (मि.मि.): १०५.५ / ७५.३
२. बीउको तौल / लम्बाइ / व्यास: ५८.१ ग्राम / ४८.० मि.मि. / ४४.९ मि.मि.
३. पातको लम्बाइ / फैलाव / क्षेत्रफल: २१.६ से.मि. / ९.३४ से.मि. = ६९.७२ वर्ग से.मि.

घ. विशिष्ट पहिचान गुण

१. Lenticel / पत्तामा सुगन्ध: ठूला, कम घनत्व । सौंफजस्तो (Anise scent)
२. ठण्ड सहनशीलता: राम्रो । बीउ: ठूलो; आकार: केन्द्रीय
३. उत्कृष्ट गुण: उत्कृष्ट organoleptic गुण; दुवानीमा टिकाउ; बजारमा उच्च माग



एभोकाडो जात: हास (Hass)

२) एटिन्जर (Ettinger)

क. उत्पत्ति तथा बाली प्रणाली

१. जातीय समूह: मेक्सिकन (Mexican) | फूल प्रकार: टाइप B
२. उत्पत्ति: इजरायलको Kefar Malal (१९४७); अमेरिकामा १९५४ मा भित्रिएको
३. फुल्ने / फल लाग्ने / पाक्ने समय: माघ पहिलो साता → फागुन अन्तिम → कात्तिक अन्तिम (Early maturity)
४. बोटको उचाइ / डाँठ परिधि: ८.५—१३.१ मि. / ६९—९७ से.मि. ।
५. औसत उत्पादन (के.जी/बोट): १५५—२१५ (उच्च उत्पादन)

ख. फलको विशेषता

१. फलको आकार / रङ: नाशपातीजस्तो / साँघुरो अण्डाकार । चम्किलो हरियो (काँचो र पाकेको दुवै)
२. फलको छाला: पातलो, चिल्लो, मसिनो (Fine & smooth) । कर्की क्षेत्र देखिन सक्छ
३. गुदीको बनावट / स्वाद: हल्का पहेँलो, मक्खनजस्तो, रेसारहित; एकसार पाक्ने । मिठास: कम
४. फलको तैल / तेल: १९.५ ग्राम । तेल: १८—२२% । बीउ: ठूलो
५. पाक्ने सम्बन्ध: फुएटैसँगै वा थोरै अगाडि पाक्छ

ग. फल तथा बीउ नाप

१. फल लम्बाइ / व्यास (मि.मि.): १०८.८ / ६१.६
२. बीउको तैल / लम्बाइ / व्यास: ३५.२ ग्राम / ४१.० मि.मि. / ३६.४ मि.मि.
३. पातको लम्बाइ / फैलाव / क्षेत्रफल: २७.७२ से.मि. / ११.४४ से.मि. = १११.६८ वर्ग से.मि.

घ. विशिष्ट पहिचान गुण

१. Lenticel / पत्तामा सुगन्ध: साना, मध्यम घनत्व । सौंफजस्तो (Anise scent)
२. बीउको विशेषता: ठूलो बीउ, गुहामा ढिलो; कोटिलेडन पहेँलो-क्रिमी
३. उत्कृष्ट गुण: उच्च उत्पादन क्षमता; मक्खनिलो रेसारहित गुदा; उत्तम organoleptic गुण



एभोकाडो जात: एटिन्जर (Ettinger)

३) रिड (Reed)

क. उत्पत्ति तथा बाली प्रणाली

१. जातीय समूह: ग्वाटेमाला (Guatemalan) | फूल प्रकार: टाइप A
२. उत्पत्ति: James S. Reed, क्यालिफोर्निया (१९४८); १९६० मा परिचय
३. फुल्ने / फल लाग्ने / पाक्ने समय: माघ दोस्रो साता → फागुन अन्तिम → असोज अन्तिम (Medium maturity)
४. बोटको उचाइ / डाँठ परिधि: ६.४—१० मि./४१.५—११५ से.मि. । डाँठ सतह: चिल्लो
५. औसत उत्पादन (के.जी/बोट): १३२—२८०

ख. फलको विशेषता

१. फलको आकार / रङ: गोलो/गोलाकार (Spheroid) । हरियो (काँचो र पाकेको दुवै हरियो)
२. फलको छाला: मध्यम मोटाइ, थोरै खुर्दरा, लचिलो । छाड्न सजिलो
३. गुदीको बनावट / स्वाद: मक्खनजस्तो, अखरोट स्वाद; काटेपछि कालो पर्दैन । मिठास: कम
४. फलको तैल / अनुपात: १६३.५ ग्राम । बीउ:छाला:गुदा = १७:११:७२ । तैल: १९—२०%
५. फल भण्डारण गुण: पाकेपछि रुखमा लामो समय टिक्छ

ग. फल तथा बीउ नाप

१. फल लम्बाइ / व्यास (मि.मि.): ७७.९ / ६१.४
२. बीउको तैल / लम्बाइ / व्यास: ३७.३ ग्राम / ४१.१ मि.मि. / ३६.८ मि.मि.
३. पातको लम्बाइ/ फैलाव / क्षेत्रफल: २३.८२ से.मि. / ११.२८ से.मि. = ९१.१८ वर्ग से.मि.

घ. विशिष्ट पहिचान गुण

१. Lenticel / पत्तामा सुगन्ध: साना, घना (Small, dense) । सौंफजस्तो (Anise scent)
२. ठण्ड सहनशीलता: हासभन्दा बढी (-१०°C सम्म) । बीउ: कोटिलेडन हल्का गुलाबी
३. उत्कृष्ट गुण: गोलो आकार अनौठो; काटेपछि कालो नपर्ने; उत्तम organoleptic गुण



एभोकाडो जात: रिड (Reed)

इ. कागती

१) सुनकागती-१

क. पहिचान तथा दर्ता

१. जात: सुनकागती-१
२. बाली: कागती
३. संकलन गरिएको ठाउँ: मोरङ
४. जात पंजीकरण/उन्मोचन: उन्मोचित
५. पंजीकरण गरिएको साल: २०७२

ख. बोट तथा फलको विशेषता

१. फल संख्या प्रति बोट: ८५०
२. फलको तौल (ग्राम): ५०
३. फलको रङ्ग: सुनौलो
४. फलको आकार: गोलो
५. फलमा बीउको संख्या: ५-७

ग. रासायनिक तथा गुणात्मक विशेषता

१. जूसको मात्रा (%): ४९
२. अमिलोपना (%): ७-१०

घ. फूल, फल र उत्पादन

१. फूल फूलने समय: साधारणतया माघ अन्तिम देखि फाल्गुण तेश्रो साता; बेमौसमी फूल जेष्ठ-असार, भाद्र-असोज र मंसिर-पौष
२. फूलको रङ्ग: सेतो
३. फल पाक्ने समय: असार देखि भाद्र सम्म ८०% फल पाक्ने र अरू महिनाभरि बेमौसमी थोरै मात्रामा पाक्ने
४. उत्पादन (टन/हेक्टर): १०-१५
५. खेति गर्न सकिने उचाई: समुद्री सतहदेखि ८०० मिटर सम्म
६. सिफारिस क्षेत्र: तराईका पानी नजम्ने उच्च टार जस्तो ठाउँ



सुनकागती-१

२) सुनकागती-२

क. पहिचान तथा दर्ता

१. जात: सुनकागती-२
२. बाली: कागती
३. संकलन गरिएको ठाउँ: स्याङ्गजा
४. जात पंजीकरण/उन्मोचन: उन्मोचित
५. पंजीकरण गरिएको साल: २०७२

ख. बोट तथा फलको विशेषता

१. फल संख्या प्रति बोट: ५००
२. फलको तौल (ग्राम): ४५
३. फलको रङ्ग: सुनौलो
४. फलको आकार: गोलो
५. फलमा बीउको संख्या: ५-८

ग. रासायनिक तथा गुणात्मक विशेषता

१. जूसको मात्रा (%): ४८
२. अमिलोपना (%): ७-१०

घ. फूल, फल र उत्पादन

१. फूल फुल्ने समय: साधारणतया माघ अन्तिम देखि फाल्गुण तेश्रो साता; बेमौसमी फूल जेष्ठ-असार, भाद्र-असोज र मंसिर-पौष
२. फूलको रङ्ग: सेतो
३. फल पाक्ने समय: असार देखि भाद्र सम्म ८०% फल पाक्ने र अरू महिनाभरि बेमौसमी थोरै मात्रामा पाक्ने
४. उत्पादन (टन/हेक्टर): १०-१५
५. खेति गर्न सकिने उचाई: समुद्री सतहदेखि ८०० मिटर सम्म
६. सिफारिस क्षेत्र: तराईका पानी नजम्ने उच्च टार जस्तो ठाउँ



सुनकागती-२

३) तेहथुम स्थानीय

क. पहिचान तथा दर्ता

१. जात: तेहथुम स्थानीय
२. बाली: कागती
३. संकलन गरिएको ठाउँ: तेहथुम
४. जात पंजीकरण/उन्मोचन: पंजीकृत
५. पंजीकरण गरिएको साल: २०७५

ख. बोट तथा फलको विशेषता

१. फल संख्या प्रति बोट: ४५०
२. फलको तौल (ग्राम): ४७
३. फलको रङ्ग: हरियोमा हल्का पहेलो
४. फलको आकार: गोलो
५. फलमा बीउको संख्या: ६-८

ग. रासायनिक तथा गुणात्मक विशेषता

१. जूसको मात्रा (%): ४३
२. अमिलोपना (%): ७

घ. फूल, फल र उत्पादन

१. फूल फुल्ने समय: बैसाख
२. फूलको रङ्ग: बैजनी
३. फल पाक्ने समय: कार्तिक-पौष
४. उत्पादन (टन/हेक्टर): १५
५. खेति गर्न सकिने उचाई: १०००-१६०० मिटर
६. सिफारिस क्षेत्र: पूर्वी पहाड



तेह्रथुम स्थानीय

ई. सुन्तला

१) खोकु स्थानीय

क. पहिचान तथा दर्ता

१. जात: खोकु स्थानीय
२. बाली: सुन्तला
३. उत्पत्ति: खोकु, धनकुटा
४. जात पंजीकरण/उन्मोचन: पंजीकृत
५. पंजीकरण गरिएको साल: २०७५

ख. बोट तथा फलको विशेषता

१. बोटको उचाई (से.मि.): २०० (१४ वर्षको कलमी)
२. फल संख्या प्रति बोट: २८०
३. फलको तौल (ग्राम): १००-१२०
४. फलको रङ्ग: चम्किलो सुन्तला
५. फलको आकार: गोलो
६. फलमा बीउको संख्या: १२-१४

ग. रासायनिक तथा गुणात्मक विशेषता

१. जूसको मात्रा (%): ४५
२. अमिलोपना (%): ०.८-१.२
३. टि.एस.एस. (%): १२-१३

घ. फूल, फल र उत्पादन

१. फूल फूलने समय: फाल्गुन-चैत्र
२. फूलको रङ्ग: सेतो
३. फल पाक्ने समय: पुष-माघ
४. उत्पादन प्रति बोट: २८ किलो
५. उत्पादन (टन/हेक्टर): २४
६. खेति गर्न सकिने उचाई: १०००-१६०० मिटर
७. सिफारिस क्षेत्र: पूर्वी पहाड



खोकु स्थानीय

२) बाँसखर्क स्थानीय

क. पहिचान तथा दर्ता

१. जात: बाँसखर्क स्थानीय
२. बाली: सुन्तला
३. उत्पत्ति: बाँसखर्क, पर्वत
४. जात पंजीकरण/उन्मोचन: पंजीकृत
५. पंजीकरण गरिएको साल: २०७९

ख. बोट तथा फलको विशेषता

१. बोटको उचाई (से.मि.): ३८९ (१५ वर्षको कलमी)
२. फल संख्या प्रति बोट: २८३
३. फलको तौल (ग्राम): ११०
४. फलको रङ्ग: चम्किलो सुन्तला
५. फलको आकार: गोलो, भेट्नोतिर हल्का उठेको
६. फलमा बीउको संख्या: ८-११

ग. रासायनिक तथा गुणात्मक विशेषता

१. जूसको मात्रा (%): ३८.१७
२. अमिलोपना (%): १.१
३. टि.एस.एस. (%): १२

घ. फूल, फल र उत्पादन

१. फूल फूलने समय: फाल्गुन-चैत्र
२. फूलको रङ्ग: सेतो
३. फल पाक्ने समय: मंसिर-पुष
४. उत्पादन प्रति बोट: २८ किलो
५. उत्पादन (टन/हेक्टर): २९
६. खेति गर्न सकिने उचाई: १०००-१६०० मिटर
७. सिफारिस क्षेत्र: गण्डकी प्रदेशको मध्य पहाड



बाँसखर्क स्थानीय

३) पारीपात्ले अगौटे-१

क. पहिचान तथा दर्ता

१. जात: पारीपात्ले अगौटे-१
२. बाली: सुन्तला
३. उत्पत्ति: जापान
४. जात पंजीकरण/उन्मोचन: पंजीकृत
५. पंजीकरण गरिएको साल: २०८०

ख. बोट तथा फलको विशेषता

१. बोटको उचाई (से.मि.): १२९.२ (१५ वर्षको कलमी)
२. फल संख्या प्रति बोट: १२०
३. फलको तौल (ग्राम): १५०-१८०
४. फलको रङ्ग: चम्किलो सुनौलो
५. फलको आकार: गोलो
६. फलमा बीउको संख्या: बीउ नहुने वा एकदमै कम हुने

ग. रासायनिक तथा गुणात्मक विशेषता

१. जूसको मात्रा (%): ४८-५०
२. अमिलोपना (%): ०.८-१
३. टि.एस.एस. (%): ८-९

घ. फूल, फल र उत्पादन

१. फूल फूलने समय: फाल्गुन-चैत्र
२. फूलको रङ्ग: सेतो
३. फल पाक्ने समय: भाद्र-कार्तिक
४. उत्पादन प्रति बोट: २८ किलो
५. उत्पादन (टन/हेक्टर): ८.६९
६. खेति गर्न सकिने उचाई: १०००-१६०० मिटर
७. सिफारिस क्षेत्र: मध्य पहाड



पारीपाल्ले अगौटे-१

